



[Hjem](#) > [Promilleafgiftsfonden](#) > [2013](#) > [Formidling og demo af ny viden](#) > **Sneskimmel i vintersæd**

Sneskimmel i vintersæd

I meget kraftigt udviklede marker kan det være aktuelt med en randbehandling.

Den tidlige såning og det milde efterårsvejr har medført, at mange vintersædsmarker i år er kraftigt udviklede. Kraftigt udviklede planter og mange dage med snedække på ikke frossen jord øger risikoen for angreb af sneskimmel. Svampen var senest udbredt efter vinteren 2009-2010, hvor der mange steder var snedække i over 70 dage.

Da vejrforholdene i vinterens løb ikke kendes, er der tale om en forsikringsprøjtning. Sprøjtning mod sneskimmel anbefales kun i helt usædvanligt kraftigt udviklede marker. I øvrige kraftige marker kan en randbehandling være aktuel, hvor man har erfaring for, at sneen ligger længe.

Anvend 0,5 l pr. ha Folicur eller 0,6 l pr. ha Orius, som også har effekt mod trådkølle. Husk i foråret, at midlerne kun må anvendes to gange pr. vækstsæson.

Behandling udføres senest muligt før snefald, det vil sige i november.



Billede 1. Sneskimmel i vinterbyg efter snesmeltning i foråret.



Billede 2. Sneskimmel i vinterbyg.

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, hvis du vil vide mere om dette emne.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'