

Hjem > Promilleafgiftsfonden > 2013 > Formidling og demo af ny viden > Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker

Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker

Forebyg at ukrudtet breder sig på permanente græsarealer og på arealer med græs i omdrift. Arealer skal leve op til Promilleafgiftsfonden for landbrug kravene om plantedække, hvis de danner grundlag for det støtteberettigede areal.

Arealer med permanent græs og græs i omdrift er støtteberettigede til Enkeltbetaling, hvis

- mindst 50 procent af jordoverfladen ethvert sted på arealet er dækket med græs eller andet grøntfoder, dog med en bagatelgrænse på 100 m²
- arealerne er så tørre, at de kan afgræsses eller udnyttes til slæt fra 1. juni til 31. august for permanente græsarealer og fra 15. maj til 15. september for arealer med græs i omdrift
- krav om slåning eller afgræsning i perioden 1. juli til 15. september opfyldes hvert år.

På lavtliggende arealer vil en plantebestand af græsser/foderplanter, der lever op til kravene, normalt ikke kunne opretholdes ved ekstensiv græsning, men kræver en udnyttelse med en vis intensitet og en passende pleje, hvor afpudsning vil være en vigtig foranstaltning.

Vær opmærksom på, at f.eks. stive græsser/vækster som lysesiv ikke regnes som foderplanter, og at arealer med 50 pct. eller mere af disse derfor ikke kan medregnes som støtteberettiget.



Ukrudt i vedvarende græs- og kløvergræs

I ældre, varige marker kan der være behov for en indsats mod ukrudt. Den mest effektive pleje består i at afgræsse og/eller tage slæt med en vis intensitet, så græsser ved hurtig genvækst får fortrin frem for lysesiv, mosebunke, brandbæger, tidsler, stor nælde og andre ukrudtsarter.

De fleste græsmarker kan "rettes op" gennem intensiv pleje. Hvor afgræsning/slæt ikke er tilstrækkeligt, kan det være aktuelt at foretage kemisk eller mekanisk bekæmpelse. En kraftig ukrudtsbestand af fuglegræs og stor nælde er tegn på overgødsning med kvælstof på varige græsarealer. Det ses ofte i de områder, hvor dyretætheden er størst, dvs. nær ledåbninger eller foderpladser.

Kemisk ukrudtsbekæmpelse

Se forslag til løsninger for [græs](#) og [kløvergræs](#).

Oversigt over midler og sprøjtefrister

Middel	Afgrøde	Tidspunkt	Behandlingsfrist
Eagle	Græs/kløvergræs	Forår/efterår	21 dage
Harmony SX	Græs/kløvergræs	Kun sensommer, aldrig i begyndelsen af vækstperiode (senest 31. august)	14 dage
Fighter 480	Græs/kløvergræs	Forår	21 dage
Primus	Græs	Forår	7 dage
Tomahawk/Lodin/Starane 180	Græs	Forår	14 dage
Starane XL	Græs	Forår	14 dage
Ariane FG S	Græs	Forår	30 dage

Græs uden kløver

Bekæmpelse udføres, hvor det er tilladt, når græs og ukrudt er i god vækst sidst i april til først i maj eller udføres på ny genvækst efter afhugning i eftersommeren. Skræpper, tidsler, stor nælde og andet rod ukrudt skal være 15-25 cm høje, så saftstrømmen transporterer aktivstoffet ned i rødderne. Det kan være nødvendigt at gennemføre bekæmpelse af rod ukrudt to år i træk. Vår- og engbrandbæger bekæmpes bedst sidst i august, hvor de nye planter er spiret frem.

Græs med kløver

Kløver i varige græsmarker kan tåle [Eagle](#) både om foråret og efteråret. I foråret hæmmer [Harmony SX](#) græsvæksten. Derfor skal midlet anvendes i juli/august. Der sprøjtes på genvækst 2-3 uger efter afpudsning eller afgræsning. Vår- og engbrandbæger bekæmpes sidst i august, hvor de nye planter er spiret frem.

Brandbæger

Vårbrandbæger og engbrandbæger er giftige og derfor uønskede – især hvor græsafrøder skal opfodres som ensilage eller hø. Hvor der er vår- eller engbrandbæger på udyrkede naboarealer, kan det være hensigtsmæssigt at begrænse spredning af frø fra disse planter ved at slå arealerne. Landbrugsarealer, der ikke dyrkes, må slås i perioden 1. maj til 30. juni, såfremt flyvehavre, hejrearter, tidsler eller giftige ukrudtsarter som vårbrandbæger forekommer. Slåningen skal ske før frøsetning, dvs. i april-maj, hvor der er vårbrandbæger og i begyndelsen af juli, hvor der er engbrandbæger.

Omlægning i sommerperioden

Hvor det er planlagt at omlægge et areal til nyt græs i juli og begyndelsen af august, bør skræpper og andet tokimbladet rod ukrudt bekæmpes effektivt i foråret uden at tage hensyn til eventuel kløverbestand. Græsafrøden kan sidst i juli nedvisnes med et glyfosat-middel, hvorefter etablering af såbed og såning af græsfrø kan ske fra sidst i juli til første tredjedel af august. Der er kløvergræsblandinger, som er målrettet våde arealer. Blanding nr. 26 er en blanding til lavbundsarealer og blanding nr. 36, der indeholder strandsvingel, har stor holdbarhed under fugtige og tørre forhold.

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Følgende punkter indgår i plejen frem mod en veltrimmet varig græsmark: 1.Afpuds eller tag første slæt, før ukrudtet blomstrer. Afpudsning gentages efter behov. F.eks. forsvinder lysesiv og flere andre ukrudtsarter ved gentagne afhugninger tæt på jordoverfladen. Skræpper kan ikke bekæmpes mekanisk. 2.En kombination af slæt og afgræsning er den bedste græsmarksdrift. Det giver et større udbytte og har bedre effekt mod ukrudt end afgræsning alene. 3.En meget intensiv afgræsning (mange dyr i en kort eller længere periode) eller en afpudsning med kort stubhøjde har en god effekt mod ukrudt.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.