

Skal ukrudt bekæmpes i ærter?

Umiddelbart kan det ikke betale sig at sprøjte for ukrudt i ærter. Men det kan hævne sig ved høst og året efter.

Der er sjældent opnået positive nettomerudbytter for at bekæmpe ukrudt i ærter, påpeger Videncentret for Landbrug.

Ukrudtssprøjtning skal derfor primært ske for at opnå en så effektiv bekæmpelse, at eventuelt restukrudt ikke bli-

ver til gene ved høsten, eller at der sker en stor opformering af ukrudt.

En enkelt behandling med nedsat dosis giver ofte tilstrækkelig effekt.

På arealer med en lille til moderat ukrudtsbestand bør der sættes på en enkelt behandling med cirka halv normaldosis - svarende til den ene splitbehandling.

Ved stor ukrudtsbestand kan det anbefales at planlægge efter den traditionelle splitsprøjtning eller én behandling med Fenix + Fighter 480, når

ærterne er 4-5 cm høje, oplyser Videncentret.

Sprøjt efter ukrudtets størrelse

Anbefalingen lyder på at bekæmpe ukrudtet i kimbladsstadiet uden hensyn til ærternes størrelse.

Mod vanskelige arter som vejpileurt, raps og gul okseøj er det vigtigt, at ingen af ukrudtsplanterne når at udvikle løvblade inden sprøjtning.

Hvis nyt ukrudt spirer senere frem i en mængde, der

vil kunne volde høstbesvær, sprøjtes der igen 10-14 dage senere.

Afsæt 1-2 meter ubehandlet sprøjtevindue, så det er muligt at vurdere effekten af 1. sprøjtning, før der tages beslutning om en eventuel opfølgning.

Vejrets betydning

God jordfugtighed giver ideelle virkningsbetingelser. Det er optimalt med 15-20 grader celcius ved brug af Fighter eller Basagran M75, men erfaringerne viser, at der med de relevante blandinger opnås

god effekt, selv om temperaturen er betydeligt lavere.

Planternes vokslag afhænger af de aktuelle vejrforhold. Såvel afgrøde som ukrudt udvikler et tyndt vokslag, når vækstbetingelserne er gode.

Derimod udvikles et kraftigt vokslag på afgrøde og ukrudt, når vækstbetingelserne er mindre gunstige, hvilket vil sige langsom vækst, tør jord, lav fugtighed, køligt, blæsende vejr.

Dosis kan med fordel tilpasses de nævnte forhold. Under gode vækstforhold kan dosis

være lav, mens dosis bør være højere, når væksten er langsom under tørre vækstforhold.

Skadede ærteplanter

Hvis vokslaget bliver beskadiget for eksempel ved mange gnave af bladrandbiller, vindslid, jordfygning eller for sen tromling, er ærterne mere følsomme over for ukrudtsprøjtning, fordi sprøjtevæsken så kan finde vej ind i planterne. Udsæt i givet fald sprøjtningen nogle dage.

Bekæmpelse af ukrudt og bladrandbiller kan kombineres, når der anvendes et pyrethroid.

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.



jpi