

Majsen skal kunne lukke af, inden efterafgrøden og nyt ukrudt vokser for meget

■ Afsluttende radrensning og såning af efterafgrøde kan ikke planlægges på en fast dato.

Efterafgrøderne skal etableres så tidligt, at de kan nå at etablere sig inden majsen lukker rækkerne. Det gælder derfor om at finde det tidspunkt for sidste radrensning og såning af efterafgrøde, som gør det muligt for majsen at lukke for lyset inden efterafgrøden og/eller nyt ukrudt vokser for meget.

Frøsåningsudstyr leveres som standardudstyr. Frøene bliver normalt bredspredt for-

an efterharven. Der arbejdes på at udvikle udstyr, der kan placere frøene i afgrænsede bånd midt i rækken, så efterafgrøden bliver etableret i en vis afstand til rækken.

Kemi forud for efterafgrøder

For nogle midler er der en vis jordvirkning. Såning af græsser bør vente 10-14 dage efter behandling med MaisTer, mens der efter anvendelse af midler mod tokimbladet ukrudt bør være en afstand på en uge. Eventuelt nyfrem-

spiret ukrudt efter såning af en græsefterafgrøde, for eksempel sort natskygge og pileurter, kan sprøjtes væk med for eksempel 0,3 liter Callisto eller 0,2 liter Callisto + 0,2 liter Tomahawk/Lodin, pr. hektar, efter at der er sået græs.

Harmony SX bør ikke anvendes på græsefterafgrøder og MaisTer er udelukket.

Sent spirende ukrudtsarter

Radrensning kan give anledning til nyfremspiring af eksempelvis spildraps,

skærmaks og hanespore. Radrensning er derfor ikke så oplagt på arealer, hvor disse arter udgør et problem. Sættes der eksempelvis ind med radrensning mod gråbynke på arealer med disse arter, kan det være aktuelt at afslutte med en sprøjtning.

Kilde:
Planteavlsoorientering 146

