

Der er fundet stankelbenslarver i græsmarker

Omsåning af græsmarker med forfrugt græs kan blive aktuelt.



På Videncentret har man i den senere tid er modtaget en del henvendelser om kraftige angreb af stankelben i marker med forfrugt

græs. Angreb ses især på lette jorder og humusjorder.

Alle afgrøder angribes, men erfaringerne er, at ærter og majs er lidt mere robuste end de øvrige afgrøder. I majs har udsæd bejdset med specialbejdsemidler eksempelvis Poncho en del effekt, men de

to største grovarekæder oplyser, at de pt. ikke har mere udsæd på lager.

- Stankelben forpupper sig omkring Sankt Hans, men aktiviteten aftager normalt omkring Grundlovsdag, oplyser landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen. Grundet det kølige forår forpupper larverne sig nok lidt senere i år.

Hun tilråder først at foretage eventuel omsåning omkring 2. uge af juni, hvis der ikke forinden er foretaget en effektiv bekæmpelse.

Bekæmpelse

Der er fra Miljøstyrelsen givet

dispensation til at bruge Danadim Progress og Perfekthion 400 EC mod stankelbenlarver efter konstateret angreb i græs og kløvergræs samt i vårbyg, havre, vårhvede, kløvergræs og roer efter græs.

- Miljøstyrelsen har netop udvidet dispensationen til også at omfatte spinat til frøavl efter græs, oplyser Ghita Cordsen Nielsen.

På lune aftener kan larverne være fremme og være lettere at ramme. Bekæmpelseseffekten kan erfaringsvis være varierende.

jpp

