

Ukrudt bør bekæmpes når sprøjtesporene netop kan ses

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne



Naturerhverv.dk



Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)

Det er vigtigt at sprøjte på rette tid i marker med tidligt sået vintersæd og ukrudtsfyldte marker.

■ Den mest stabile effekt af midler med jordvirkning (Boxer, DFF og Stomp/Activus) opnås ved sprøjtning i afgrødens stadium 10-11 - altså når sprøjtesporene netop er blevet synlige. Det oplyser Videncentret for Landbrug og fortsætter:

- Som tommelfingerregel anbefaler vi sprøjtning med Boxer, Stomp/Activus og DFF 10-18 dage efter

såning. Med det korteste interval ved såning først i september.

- For midler og blandinger med både jord- og blad-virkning (Lexus, Flight Xtra, Othello og Absolute 5) gælder, at ukrudtet lige skal være spiret frem, hvilket vil sige cirka en uge efter, at sprøjtesporene er blevet synlige.

- Midler med ren bladeffekt er Atlantis, Oxitril/Briotril, Pico, Primera Super/Foxtrot og Topik.

Man bør være ekstra opmærksom på, at de tidligst såede marker og marker med meget ukrudt og/eller vanskelige arter behandles til tiden.

jpj