

# Måske er rapsudsæden ikke bejdset mod skadedyr

**Det er meget vigtigt at vide, om rapsudsæden er bejdset mod rapsjordlopper eller ej.**

I år kan man ikke være sikker på at få rapsudsæd, der er bejdset mod rapsjordlopper, som derfor kan gøre alvorlig skade, påpeger landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen.

Som bekendt er alle bejdsemidler med aktivstofferne clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam, som er af typen neonicotinoider, blevet forbudt fra 1. december i en periode på foreløbig to år i raps og andre afgrøder med bitræk. I denne periode skal det undersøges, om midlerne har en skadelig effekt på bier.

Bejdset rapsudsæd, der ikke bliver brugt i dette efterår, må således ikke udsås i efteråret 2014. Grovvarerfirmaerne har i dette efterår derfor både solgt udsæd med og uden skade-

dyrsbejdse for at undgå at ligge inde med overgemt udsæd. Der har således ved sent salg været solgt udsæd, som kun er bejdset med svampemidlet thiram.


## Antageligt få rapsjordlopper i år

Det er meget vigtigt at være opmærksom på, om der er


sået udsæd, som er bejdset mod rapsjordlopper eller ej. Dette kan aflæses på sækkene med udsæd. Bejdsemidlerne giver en beskyttelse mod rapsjordlopper frem til omkring 2-4 løvblade er udviklet, og denne beskyttelse fås ikke ved anvendelse af ubejdset udsæd.

Angrebsstyrken af raps-

jordlopper kan igen følges i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Der forventes i år relativt svage angreb af rapsjordlopper, men vær alligevel opmærksom især i marker, hvor der er udsæd ubejdset raps.



Rapsjordlopper indsamlet fra fangbakke. (Foto: Videncentret for Landbrug)



Rapsplante angrebet af rapsjordlopper. (Foto: Videncentret for Landbrug)

## Observation af rapsjordlopper i denne uge

- De første aflæsninger på landsplan af fangster er foretaget, og der er ikke fundet rapsjordlopper eller kun fundet meget få rapsjordlopper.
- Der er udstationeret gule fangbakker på cirka 60 lokaliteter for at følge forekomsten af rapsjordlopper og vurdere behovet for at bekæmpe angreb af rapsjordloppers larver.
- Bekæmpelse rettet mod bladgnav i fremspiringsfasen kan ikke fastlægges via gule fangbakker.
- Bekæmpelse af bladgnav anbefales frem til at cirka fire løvblade er udviklet, hvis der er over 10 procent bortgnavet bladareal.
- Hold især øje med udviklingen i marker, hvor der er anvendt udsæd, der ikke er bejdset mod skadedyr.

Kilde: Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

