



Registrering af rapsjordlopper i uge 44

Tærsklen for rapsjordlopper blev i år overskredet på ca. 15 procent af lokaliteterne. Der skal nu ikke foretages flere registreringer.


Der er udsat gule fangbakker på ca. 70 lokaliteter for at følge forekomsten af rapsjordlopper og vurdere behovet for at bekæmpe angreb af rapsjordloppers larver.

Der findes stadig relativ få rapsjordlopper. I nedenstående figur er udviklingen i år sammenholdt med udviklingen i tidligere år.

Bekæmpelse rettet mod larver anbefales, hvis der indenfor 3 uger i alt fanges over 25 rapsjordlopper pr. fangbakke.

Tærsklen har i år været overskredet på ca. 15 procent af lokaliteterne, og på mange af disse lokaliteter er der kun netop fundet over bekæmpelsestærsklen.

Dette var sidste registrering i år. Vi takker for indberetningerne.



Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2007-2013. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som du nuværende runde fangbakker).

Se [data og uddybende kommentar](#)

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'