

**PLANTEAVL**

Kontakt: Kaj Lund Sørensen
 kls@effektivtlandbrug.dk
 61 20 96 67



Bekæmpelse af skulpesnudebiller

■ Under blomstringen kan der være behov for at bekæmpe skulpesnudebiller i vinterraps. De senere år har angrebene været overvejende svage. Det fremgår af PlanteNyt 806.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for skulpesnudebiller er seks biller pr. plante. Skulper under to cm kan angribes af skulpegalmyg alene uden hjælp fra skulpesnudebiller.

klS

Bekæmpelse af skulpegalmyg

■ Bekæmpelse af skulpegalmyg anbefales kun, hvis man har erfaring for mere udbredte angreb på ejendommen – det vil sige mange gul-brune opspringende skulper.

I de fleste marker ses angreb kun i de yderste 1-2 meter af marken, oplyses det i PlanteNyt 806 på Landbrugsinfo.

Har man erfaring for mere udbredte angreb i vinterraps på ejendommen, foretages en bekæmpelse i hele marken ved begyndende flyvning af skulpegalmyg.

Skal der opnås en tilfredsstillende bekæmpelse ved mere udbredte angreb, er der behov for i alt 2-3 velplacerede behandlinger med omkring 5-6 dages mellemrum.

Dette skyldes rapsens hurtige vækst, hvor ny vækst ikke er beskyttet (kontaktmidler), og galmyggens flyvning over en længere periode (3-4 uger).

Er første generation bekæmpet tilfredsstillende, er der ikke behov for bekæmpelse af anden generation cirka 4 uger senere.

Forventet flyvetidspunkt for skulpegalmyg er oftest omkring begyndende blomstring og kan følges på Landbrugsinfo.dk.

Denne temperaturmodel oplyser kun om forventet flyvetidspunkt, og siger ikke noget om angrebsstyrken. Antallet af skulpegalmyg vil blive fulgt via gule fangbakker på et begrænset antal lokaliteter i 2013, men antallet af lokaliteter med fangbakker er ikke tilstrækkeligt til at angive bekæmpelsesbehovet.

klS

Følg flyvningen af engrapgræsgalmyg

■ På baggrund af en temperaturmodel kan forventet flyvning af engrapgræsgalmyg følges på Landbrugsinfo.

Aarhus Universitet har udviklet en temperaturmodel, der kan give en prognose for forventet flyvning af engrapgræsgalmyg, der er et skadedyr i engrapgræs til frø, især i ældre marker. Flyvningen kan løbende følges på Landbrugsinfo på siden »varsling/registreringsnet«. Modellen angiver kun forventet flyvetidspunkt, og siger ikke noget om angrebsstyrken, fremgår det af PlanteNyt 807.

Karate 2,5 WG har en off label-godkendelse til bekæmpelse af engrapgræsgalmyg.

klS