

Er skadetærsklen for glimmerbøsser for lav ?

■ I England har man de senere år undersøgt skadevirkningen af glimmerbøsser i raps, oplyser landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen.

Derovre er tærsklerne højere end de danske, som er på tre biller pr. plante i vinterraps i det tidlige knopstadiet og fem til seks biller pr. plante i det sene knopstadiet.

- Det interessante er, at bekæmpelsestærsklen i England er afhængig af plantebestanden, påpeger Ghita Cordsen Nielsen og fortsætter:

- Dette forklares med, at raps har en god compensationsevne og kan danne nye knopper, når nogle af knopperne bliver angrebet af glimmerbøsser, og raps generelt danner mange flere knopper end der kommer skulper og frø ud af. I meget tætte bestande har rapsen dog ikke mulighed for at kompensere, hvorfor bekæmpelsestærsklen derfor er meget lavere end i marker med færre planter pr. m².

Der er dog ikke planer om at ændre de danske bekæmpelsestærskler for glimmerbøsser, men undersøgelsen viser, at de danske tærskler tilsyneladende ikke er for høje. Hvor man ligger lige omkring bekæmpelsestærsklen kan man måske inddrage plantetætheden, før man beslutter sig for bekæmpelse.

jpj



Engelske forsøg kunne tyde på, at rapsmarker med lavere plantetæthed kan tåle flere glimmerbøsser end de tre-seks biller pr. plante, som i dag sættes som skadetærskel i Danmark.