



Hjem > Promilleafgiftsfonden > 2014 > Formidling og demonstration ny viden > Feromonfælder til gammaugler i bederoer

Feromonfælder til gammaugler i bederoer

Et hollandsk firma tilbyder feromonfælder til at følge forekomsten af gammaugler i f.eks. roer. Sammenhængen mellem fangster og angreb er dog ikke fastlagt.

Det hollandske firma Pherobank tilbyder feromoner til at følge forekomsten af forskellige skadedyr bl.a. gammaugler (*Autographa gamma*), som kan optræde som et skadedyr i bederoer og specialafgrøder bl.a. salat, se <http://www.pherobank.com/Pages/default.aspx>. Se fælden og symptomer på angreb nedenfor.

Der er desværre ikke udviklet nogen bekæmpelsestærskel for fangster, så sammenhængen mellem fangster og angreb er ikke fastlagt. GartneriRådgivningen har afprøvet fælden på en enkelt lokalitet med salat i 2010, hvor der blev fanget mere end 50 gammaugler pr. uge, men fangsten kunne ikke relateres til angrebet af larver senere i marken, måske fordi der var sprøjtet med Dipel ES i marken.

Dansk Landbrug Sydhavsørerne og Nordic Beet Research opstiller i år fælder på nogle lokaliteter i forbindelse med GUDP projektet IPM i roer, og det kan måske give nogle flere erfaringer.

Der er ikke udviklet feromonfælder til at følge forekomsten af bedeugler og andre uglelarver, som også kan afløve bladene i roer.

I 2013 optrådte der gammauglelarver i flere roemarken, og bekæmpelse blev iværksat i flere marker i juli. Larverne er relativt lette at bekæmpe med godkendte pyrethroider (Cyperb 100/100W, Cythrin 500, Karate), men ofte opdages angrebene for sent.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'



Billede 1. Feromonfælde til fangst af gammaugler. Fotograf: Dorrit Andersen, GartneriRådgivningen A/S.



Billede 2. Fangst af gammaugler i feromonfælde. Fotograf: Dorrit Andersen, GartneriRådgivningen A/S.



Billede 3. Nærbillede af gammaugler. De kendes let på gammategnet på vingerne.



Billede 4. Gnav efter gammauglelarver i roer.



Billede 5. Gammauglelarve. Larven kendes på dens "måleragtige" bevægelse.



Billede 6. Forpuppet gammaugle.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.