

PLANTEVÆRN



PLANTEVÆRN
Kontakt: Jørgen P. Jensen
jpjensen@effektivtlandbrug.dk
40 41 76 84 - 63 38 25 26



Reduceret jordbehandling kræver ekstra tjek på svampesprøjtningen

Ved svampebekæmpelse i hvede med forfrugt hvede og reduceret jordbearbejdning skal der være tilstrækkelig effekt mod både hvedebladplet og Septoria.

Hvedebladplet kan findes i de fleste hvedemarkers i Danmark, men en målrettet bekæmpelse er oftest kun nødvendigt ved forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning, da angrebene fra planterester her er mest udbredte.

Det oplyser landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen. Hun fortæller videre:

- Der bør sættes på en delt aksbeskyttelse ved bekæmpelse af hvedebladplet, nemlig i vækststadium 37-39, hvor fanebladet er synligt til fuldt



Hvedebladplet smitter fra halmrester af hvede. (Foto: Videncentret for Landbrug)

udviklet og frem til cirka 14 dage senere.

Da svampen kan udvikle sig meget hurtigt, bør fanebladet ikke stå ubeskyttet ret længe. Fra smitten sker, til symptomer ses, går der kun 3-8 dage.

Effekt mod både bladplet og gråplet

Ved forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning kan hvedebladplet være dominerende i afgrøden.

- Der er derfor ikke plads til



hvedegråplet – ofte betegnet Septoria, som normalt er problemet i hvede, påpeger Ghita Cordsen Nielsen.

I andre år har hvedebladplet dårlige udviklingsmuligheder på grund af kulde, og der opstår blandingsinfektioner med både hvedebladplet og Septoria eller kun Septoria.

Da udviklingen ikke kendes på forhånd, er det derfor nødvendigt at vælge løsninger, som har tilstrækkelig effekt mod begge svampe, hvilket øger omkostningerne til bekæmpelse.

- Der er opstået resistens hos hvedebladplet mod strobiluriner, så disse ikke længere har fuld effekt på hvedebladplet. Følgende midler er strobiluriner eller indeholder strobiluriner: Amistar, Aproach, Comet, Opera, Viverda, understreger landskonsulenten.

jpj



Angreb af hvedebladplet til venstre og Septoria til højre. Pletterne ved angreb af hvedebladplet er altid mørkere eller lysere i midten, når pletterne bliver større. Pletterne ved angreb af Septoria er mere firkantede, og de sorte frugtleger er også tydelige. (Foto: Videncentret for Landbrug)

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne



Naturerhverv.dk



Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)