


Fire strategier mod svampe i hvede

Hvede - svampesprøjtning



Fire strategier for svampesprøjtning i hvede. Vækststadier, omtrentlige datoer og doseringsintervaller er angivet. I de angivne doser efter vækststadium 31-32 er doseringen mod meldug ikke indeholdt. I strategi 2 kan man evt. vælge at dele sidste behandling (st. 39-45 og 14 dage senere). De angivne datoer for vækststadierne vil blive tidligere i år end angivet.

I år skal der antageligt sprøjtes tidligere, end vejledningerne anbefaler.

I figur 100 har Videncentret for Landbrug opstillet fire forskellige svampestrategier, som kan være aktuelle i de fleste år.

Men netop i år efter en mild vinter og et tidligt forår vil svampesprøjtningerne nok skulle foretages tidligere, påpeger Videncentret, der videre oplyser:

- Doseringen for meldugmiddel er ikke indeholdt i de viste doseringer efter vækststadium 31-32. Ved meldugangreb frem til skridning tilsættes et meldugmiddel, da de anbefalede midler mod Septoria ikke har tilstrækkelig effekt mod meldug.

Fire strategier

De laveste indsatser mod

Septoria benyttes i de mindst modtagelige sorter og ved lavt smittetryk.

Doserne er gældende ved en hvedepris på omkring 130-150 kr. pr. hkg. Som det fremgår, er der angivet en samlet mængde på 50-80 procent af normaldoseringen ved den delte aksskyttelse omkring skridning. I forsøgene har den optimale mængde varieret fra 25 procent til 100 procent.

Forslag:

I strategi 1 har meldug, gulrust eller nedbør i stadium 32 udløst en tidlig sprøjtning, og der er derfor udført 3 sprøjtninger.

I strategi 2 er angrebene af meldug eller gulrust kommet lidt senere, eller nedbør har udløst en sprøjtning mod Septoria i stadium 33, så man ikke har kunnet vente til at udføre en typisk delt akssprøjtning, som ses i strategi 3. Sidste behandling i strategi 2 kan udføres på én gang som angivet, men man kan også vælge at dele den i stadium 39-45 og 14 dage senere.

I strategi 3 er udført en delt akssprøjtning, når fanebladet er synligt eller fuldt udviklet i stadium 37-39, og behandlingen gentages 2-3 uger senere.

I strategi 4 er der kun sprøjtet én gang. Denne strategi anvendes kun ved et meget lavt smittetryk.



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne



Naturerhverv.dk



Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)