

Få ny viden om svampe-sprøjtning i majsmarker

På grovfoderekskursionen den 12. juni ses på behovet for svampbekæmpelse i majs.



Bladsvampe i majs udvikler sig ofte fra juli måned, påpeger specialkonsulent Marian Damsgaard Thorsted fra videntcentret.

- Begynd derfor at holde øje med svampene i god tid i juni måned, så begyndende angreb ikke overses. Svampene trives bedst i fugtigt vejr. Majsøjeplet foretrækker køligt vejr, mens majsbladplet foretrækker varmere vejr.

I en upløjet majsmark er der mange planterester, hvor svampene kan overleve.

- Der er derfor meget smitstof, som kan overføres fra den ene afgrøde til den næste, hvis der ikke pløjes forud for næste afgrøde. Risikoen for bladsvampe i majs er størst, hvor der er forfrugt majs og reduceret jordbearbejdning.



Billede med majsøjeplet. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, VFL)

Bekæmpelse ved udbredte angreb

Svampesprøjtning af majs helsæd anbefales i to tilfælde, påpeger Marian Damsgaard Thorsted.

- I alle marker med forfrugt majs og reduceret jordbearbejdning anbefales konsekvent bekæmpelse af bladsvampe. Bekæmpelse anbefales også i alle marker med udbredte angreb - uanset dyrkningsteknik. Der er ikke en tærskel for angreb, men ved 5-10 procent planter med begyndende angreb anbefales bekæmpelse.

Opera anvendes til svampbekæmpelse i majs og er aktuel i juli og august.

- En forudsætning for svampesprøjtning i begyndelsen af august er dog, at Opera får udvidet sin godkendelse til vækststadium 65 (blomstring). Ofte er én behandling med 0,7 l/ha Opera nok, men ved tidlige angreb kan der laves to behandlinger med 0,5 l/ha pr. gang, slutter Marian Damsgaard Thorsted.



Billede med majsbladplet. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, VFL)