

Hjem > [Promilleafgiftsfonden](#) > [2014](#) > [behovsbestemt bekæmpelse skadegørere](#) > **Nyt om skadegørere i registreringsnettet i korn og frøgræs i uge 27**

Nyt om skadegørere i registreringsnettet i korn og frøgræs i uge 27

Bygbladplet har i det varme vejr bredt sig i mange vårbygmarker især i sorterne Propino og Quench. Træf beslutning om bladlusbekæmpelse nu.

Vårbyg

Både bygbladplet, bygrust og Ramularia har bredt sig i den forløbne uge. Mest bygbladplet ses i sorterne Propino og Quench. Mest bygrust ses i sorten Quench.

Vårbyggen er nu så fremskreden i udviklingen, at svampebekæmpelse ikke længere er aktuel. Det gennemsnitlige vækststadium er st. 71 (kerneindholdet vandtågt, de første kerner har nået halv størrelse), mens de længst udviklede marker er langt henne i kerneudviklingen.

Dette var sidste bedømmelse i vårbyg i år. Vi takker for indberetningerne.

Havre

Meldug og bygbladplet har bredt sig i den forløbne uge.

Markerne er nu så fremskredne i udviklingen, at svampebekæmpelse ikke længere er aktuel.

Dette var sidste registrering i havre i år. Vi takker for indberetningerne.

Alm. rajgræs

Der er svampesprøjtet i ca. 90 procent af markerne i registreringsnettet. Der er fortsat ikke fundet sortrust i registreringsnettet. I et enkelt tilfælde er der fundet angreb af sortrust ved Hjerm ved Holstebro i en tidlig sort. Evt. sortrust bekæmpes indtil ca. 3 uger før høst.

Dette var sidste registrering i rajgræs i år. Hvis man har mulighed for det, må man gerne foretage en bedømmelse af angreb af sortrust lige før høst. Vi takker for indberetningerne.

Majs

Der er pt. ikke fundet majshalvmøl i feromonfælderne.

De første registreringer af bladsvampe i majs begynder i den kommende uge.

Nedenfor ses link til registreringerne og uddybende kommentarer til de enkelte afgrøder. Se også fotos nedenfor

- [Alm. rajgræs](#)
- [Vårbyg](#)
- [Havre](#)
- [Majshalvmøl](#)

Se også [sygdomsangreb i observationsparceller](#) bedømt af NaturErhvervstyrelsen.




Billede 1. Gammaugler. Der er pt. ikke fundet majshalvmøl i nogen af de udstationerede feromonfælder i majs. I enkelte fælder har gammaugler dog forvildet sig ind i fælderne. Gammauglerne kendes på gammategnet på vingerne.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'



Figur 1. Udviklingen af bygbladplet i vårbyg i 2014 i forhold til de 2 foregående år.

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, hvis du vil vide mere om dette emne.