



Registrering af rapsjordløpper uge 43

Aktiviteten er aftaget. Der er i år blevet udløst bekæmpelse rettet mod larver på ca. 45 procent af lokaliteterne. Der Promilleafgiftsfonden for landbrug foretages nu ikke flere registreringer.

Der er i registreringsnettet udstationeret gule fangbakker på ca. 80 lokaliteter for at følge forekomsten af rapsjordløpper og vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordløppers larver.

Bekæmpelse rettet mod larver anbefales ved en samlet fangst på 25 rapsjordløpper pr. fangbakke indenfor 3 uger i hovedflyvningsperioden, forudsat at æglægningen er begyndt.


Aktiviteten er aftaget. Der er i år udløst bekæmpelse på ca. 45 procent af lokaliteterne.

I figur 1 nedenfor kan forekomsten i år sammenlignes med tidligere år.

Pyrethroiderne Karate (0,2 kg pr. hektar), Kaiso Sorbie (0,1 kg pr. hektar), Nexide CS (0,06 liter pr. ha), Cythrin 500 (0,04 l pr. ha) og Cyperb 100/100 W (0,2 liter pr. ha) er godkendt til bekæmpelse af rapsjordløpper. Med de nye afgifter er Karate og Kaiso Sorbie billigst. Der er kun få erfaringer med nedsatte doser.

Dette var sidste registrering i år. Vi takker for indberetningerne.

Se [data](#) og [uddybende kommentar](#).



Figur 1. Fangster af rapsjordløpper i gule fangbakker i efterårene 2008-2014. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som du nuværende runde fangbakker).

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, hvis du vil vide mere om dette emne.

