

PLANTEVÆRN

Blandes flere midler, kan det stoppe sprøjten eller svide afgrøden

Hvornår kan man blande flere sprøjtemidler sammen i samme tank?

Etiketterne indeholder desværre færre og færre blandingsanvisninger, og det er næsten altid kun for blanding af to midler. Men i praksis blandes ofte flere midler, mikronæringsstoffer og tilsættes additiver.

Hvor frit kan man blande uden at opleve, at sprøjten stopper i dysserne eller afgrøden står sveden efter få dage? Det har Videncentret for Landbrug vurderet.

- Umiddelbart er det ikke muligt at give sikre anvisninger for, hvornår man kan blan-



Er man i tvivl om midler og hjælpe-stoffer kan blandes i marksprøjten, kan man selv lave en prøveblanding i glas og se efter 4-8 timer, om der er udfældning.

de, og hvornår man ikke kan blande et plantebeskyttelsesmiddel med et eller flere andre

plantebeskyttelsesmidler og eventuelle mikronæringsstoffer, siger landskonsulenterne.

Ofte er vandet årsagen

I Middeldatabasens blandingsstabeller indgår, ud over etiketternes blandingsmuligheder, også et stort antal blandinger af to midler under kategorien »Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges».

Disse anbefalinger er primært baseret på firmaernes erfaringer med anvendelsen af deres produkter i såvel Danmark som i nabolandene. Ofte vil der være foretaget test af midlernes fysiske blandbarhed.

- I praksis er der erfaring for, at flere midler i de fleste tilfælde ofte lader sig blande uden problemer. Når der alligevel sker udfældninger, kan det skyldes, at midlerne ikke er fysisk blandbare, men også at vandkvaliteten udløser udfældningen. Som tommelfingerregel vil midler kunne blandes, når midlerne to og to kan blandes. Dog vil risikoen for udfældning blive øget, jo flere midler der blandes. Læs altid etiketten, og er der forbehold for nogle blandinger, kan det være en indikation for, at man generelt bør være forsigtig med blandinger med dette middel.

Lav selv en lille testblanding

Har man ikke prøvet en blanding før, er det naturligvis en god idé at spørge en konsulent eller hos et af de firmaer, som producerer produkterne.

- Ofte vil det kun være muligt at få et svar med visse forbehold. Man vil derfor løbe en mindre risiko, hvis man første gang kun blander op til et mindre areal og ser om blandingen kan udsprøjtes uden problemer.

En anden mulighed er at lave sin egen test for blandbarhed ved at fremstille blandingen i en klar glasbeholder og lade opløsningen stå i 4-8 timer. Mange blandinger vil danne fnug, men de kan ofte opløses igen. Hvis der dannes uopløseligt bundfald eller klister, vil det givetvis også ske i sprøjten.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne



Naturerhverv.dk



Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)