

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Naturerhverv.dk

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)



PLANTEVÆRN
Kontakt: Jørgen P. Jensen
jpjensen@effektivtlandbrug.dk
40 41 76 84 - 63 38 25 26



Afgrøderne i denne uge

■ Planteavlskonsulenterne har i denne uge indberettet til Videncentrets registreringsnet om sygdomme og skadedyr i afgrøderne landet over:

Hvede: I en del hvedemarker i vækststadium 32 er der udløst bekæmpelse mod septoria.

Triticale: Gulrust er fortsat meget udbredt og kan findes i over 60 procent af markerne og mest findes i Gringo. I Ragtac er også en del meldug, og der er udløst bekæmpelse i knap 30 procent af markerne med denne sort.


Det gennemsnitlige vækststadium er st. 31 (1 knæ udviklet), mens de længst udviklede marker er i st. 32 (2 knæ udviklet)

Vinterbyg: Skoldplet er mest udbredt og mest er fundet i Apropos og California, mens mindst er fundet i Matros, der i år dækker over 75 procent af vinterbygarealet. Bekæmpelse af skoldplet er i modtagelige sorter aktuel fra vækststadium 31 (1 knæ udviklet) ved over 10 procent angrebne planter og mindst 3 dage med nedbør fra st. 31. Vær især opmærksom på angreb af skoldplet i marker med reduceret jordbearbejdning og forfrugt byg.

Meldug er næstmest udbredt, og der er udløst bekæmpelse i 5 procent af markerne.

Bygrust og bygbladplet er kun mindre udbredt.

I flere marker med blandt andet Matros ses lige nu mange brune fysiologiske pletter, som kun tillægges mindre betydning.




Fysiologiske pletter i vinterbygssorten Matros fotograferet 22. april. Angreb tillægges kun mindre betydning. (Foto: Videncentret for Landbrug)

■ Ved bekæmpelse af skoldplet og/eller meldug fastlægges dosis efter markens vækststadium. Det vil sige, om det er en tidlig sprøjtning omkring vækststadium 31-32, hvor der forventes endnu en sprøjtning eller om marken er så fremskreden i udviklingen, at svampesprøjtning kan afsluttes omkring begyndende skridning.

I de længst fremskredne marker, der snart begynder skridning, vælges 30-50 procent dosis af midler med god effekt mod de dominerende sygdomme.

Det gennemsnitlige vækststadium er st. 31 (1 knæ udviklet), mens de længst udviklede marker er i st. 37 (fanebladet synligt).

Vinterhvede: Gulrust har bredt sig i den forløbne uge.



Gulrust i hvedesorten KWS Cleveland fotograferet den 22. april. (Foto: Gefion)