

Afgrøderne netop nu

■ Planteavlskonsulenterne har i denne uge indberettet til Videncentrets registreringsnet om sygdomme og skadedyr i afgrøderne landet over:

Vinterbyg: Skoldplet og dernæst meldug er fortsat de mest udbredte svampesygdomme, mens angrebene af bygbladplet og bygrust nu er mindre udbredte, oplyser landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen. Hun fortæller om afgrøderne:

Mindst skoldplet er fundet i sorten Matros, der i år dækker over 75 procent af vinterbygarealet. Vær især opmærksom på angreb af skoldplet i marker med reduceret jordbearbejdning og forfrugt byg.

Tilfælde af meget meldug er fundet i de fleste sorter. Meldug bekæmpes til og med gennemskridning ved over 50 procent angrebne planter. Der er udløst bekæmpelse rettet mod meldug i cirka 5 procent af markerne.

I de længst fremskredne marker, der snart begynder skridning eller allerede er ved at skride, vælges ved bekæmpelsesbehov 30-50 procent dosis af midler med god effekt mod de dominerende sygdomme.

Vinterhvede: Gulrust har igen bredt sig i den forløbne uge. I registreringsnettet er der i denne uge fundet gulrust i 40 procent af markerne med JB Asano, 14 procent af markerne med Jensen.

Der er ikke fundet brunrust.

Meldug er fundet i flere sorter og mest i Mariboss, hvor der er udløst meldugbekæmpelse i 10 procent af markerne.

I mange marker er der mere Septoria end normalt. Ved kraftige angreb eller ved 4 dage med nedbør fra vækststadium 32, hvor andet knæ er udviklet, anbefales bekæmpelse af Septoria. Mange steder har der været 1-2 dage med nedbør i sidste uge, hvor der er sket mere nysmitte end normalt, som følge af de mere udbredte angreb i år.

Triticale: Gulrust er fortsat meget udbredt og kan findes i cirka 70 procent af markerne og mest findes i Gringo, hvor der er udløst bekæmpelse i knap 80 procent af markerne.

I Ragtac er også en del meldug, og der er udløst bekæmpelse i knap 20 procent af markerne med denne sort.

Septoria er kun mindre udbredt.

Rug: Skoldplet er fortsat mest udbredt og i nogle marker ses ret udbredte angreb. Skoldplet bekæmpes, hvis der har været fugtige forhold, og angreb breder sig op ad planterne.

Der er fundet brunrust i 4 procent af markerne. Meldugangrebene er svage.

Alm. rajgræs: Kronrust er meget udbredt og findes i cirka 2/3 af markerne. Ved mere udbredte angreb anbefales bekæmpelse med Folicur, hvor der fås en effekt mod meldug, som forekommer i nogle marker.

Strandsvingel: Meldug er meget udbredt og forekommer i knap 90 procent af markerne. Bekæmpelse anbefales ved mere udbredte angreb.

Enggrapgræs: Rust er dominerende og findes i cirka 50 procent af markerne. Ved mere udbredte angreb anbefales bekæmpelse.



Angreb af hvedebladplet i hvede med forfrugt hvede og reduceret jordbearbejdning fotograferet i uge 17. (Foto: Lise Nistrup, Aarhus Universitet, Flakkebjerg)

Artikel i EffektivtLandbrug den 3. maj 2014

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri



Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne



Naturerhverv.dk



Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)