

Afgrøderne netop nu

■ Planteaviskonsulenterne har i denne uge indberettet til videncentrets registreringsnet om sygdomme og skadedyr i afgrøderne landet over:

Hvede: Der er på nuværende tidspunkt et helt usædvanligt højt smittetryk af **septoria** i hvedemarkerne, oplyser landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen.

De udbredte angreb og den seneste tids fugtige vejr giver ideelle betingelser for yderligere smitte og spredning af angreb til de øverste blade, og det er derfor meget vigtigt at bekæmpe septoria i alle ubeskyttede marker ved førstkomende lejlighed.

Det høje smittetryk og det fugtige vejr nødvendiggør brug af højere doser og kortere intervaller mellem sprøjtningerne. I mange tilfælde kan man i år komme op på 3-4 sprøjtninger.

Det anbefales ved sprøjtning mod septoria på nuværende tidspunkt at justere dosis efter angrebsniveauet.

I de længst udviklede marker med KWS Dacanto og Hereford med kraftige angreb og andre marker med kraftige angreb er det aktuelt at øge dosis betydeligt.

Det høje smittetryk og fugtige vejr medfører også, at der kun kan forventes en virkningstid på maksimalt 14 dage af den tidligere sprøjtning.

Gulrust har igen bredt sig i den forløbne uge. Fra praksis er i mange tilfælde meldt om angreb især i JB Asano og Jensen.

Meldug er fundet i alle sorter og mest i Mariboss, hvor der er udløst meldugbekæmpelse i cirka 10 procent af markerne i den forløbne uge. Bekæmpelse anbefales i modtagelige sorter ved over 25 procent angrebne planter frem til skridning. Fra praksis meldes især om angreb på let jord.

Der er kun på enkelte lokaliteter fundet **hvedebladplet** i de pløjede marker. Fra praksis er også meldt om enkelte tilfælde af angreb i pløjede marker.

Fra praksis er der derimod i flere marker med forfrugt hvede og reduceret jordbearbejdning rapporteret om mere udbredte angreb af hvedebladplet.

Vinterbyg: **Skoldplet** og dernæst **meldug** er fortsat de mest udbredte svampesygdomme. Skoldplet har bredt sig i ugens løb, og mest findes i California og Apropos, men også i de øvrige sorter er der marker med meget skoldplet. Inkubationstiden for skoldplet er ved 18° C i 10 dage. Vær især opmærksom på angreb af skoldplet i marker med reduceret jordbearbejdning og forfrugt byg.

Tilfælde af meget meldug er fundet i alle sorter, og der er denne uge udløst bekæmpelse i 10 procent af markerne. Meldug bekæmpes til og med gennemskridning ved over 50 procent angrebne planter.

Efter skridning kan der også forventes angreb af **ramularia** især i Matros, der er mest modtagelig. Angreb af ramularia er ofte af mindre betydning for udbyttet, end det ser ud til, men der ønskes også noget effekt på ramularia.

Ved bekæmpelsesbehov omkring skridning kan der afhængig af smittetryk vælges 30-50 procent dosis af midler med god effekt mod de dominerende sygdomme. Ved meget skoldplet vælges højeste dosis.

Triticale: **Gulrust** breder sig fortsat. Der er mest i Gringo, hvor der er udløst bekæmpelse i 95 procent af de ubehandlede marker i denne uge.

I Ragtac er også en del **meldug**, og der er udløst bekæmpelse i 10 procent af markerne med denne sort i denne uge. Meldug anbefales bekæmpet ved over 25-50 procent angrebne planter på nuværende tidspunkt og bekæmpes frem til fuld blomstring.

Rug. **Skoldplet** er fortsat mest udbredt, og det fugtige vejr har øget angrebene. Skoldplet bekæmpes indtil omkring gennemskridning, hvis angreb breder sig opad planterne.

Der er meldt om begyndende angreb af **brunrust** i flere marker, så udviklingen skal følges. Brunrust bekæmpes ved over 10 procent angrebne planter.

Vårbyg: Der er ikke fundet angreb eller kun svage angreb. Det gennemsnitlige vækststadium er 25 – buskning – mens de længst udviklede marker er i stadium 31, hvor første knæ er udviklet.

Havre: Der er ikke fundet meldug.

Alm. rajgræs: **Kronrust** er fortsat meget udbredt. Der er stor forskel i angrebsgraden, og i nogle marker er der kraftige angreb. Der er denne uge udløst bekæmpelse i cirka 70 procent af de ubehandlede marker.

Meldug forekommer også i flere marker, men anbefales kun bekæmpet indtil skridning.

Strandsvingel: **Meldug** er fortsat mest udbredt og bekæmpes til begyndende skridning. Det fugtige vejr fremmer **bladplet**, som har bredt sig i den forløbne uge.

Engrapgræs: **Rust** er fortsat mest udbredt og forekommer i cirka 70 procent af de ubehandlede marker.

Rust bekæmpes indtil gennemskridning og **meldug** indtil skridning.

jpj

Rust i rødsvingel til frø.
(Foto: Lars Andresen, DL-Syd)

