

Flere rapsjordløpper i denne uge

■ - Der er nu en stigende forekomst af rapsjordløpper i mange marker, men i næsten alle tilfælde under bekæmpelsestærsklen for larveskade.

Det oplyser landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen fra Videncentret for Landbrug.

Behovet for bekæmpelse af bladangreb skal man se sig til. De seneste dage er meldt om tilfælde af kraftige bladangreb.

Der er udstationeret gule fangbakker på 80 lokaliteter for at følge forekomsten af rapsjordløpper og vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordløppens larver.

- Det solrige vejr har øget antallet, påpeger landskonsulenten. Bekæmpelse rettet mod larver anbefales ved en samlet fangst på 25 rapsjordløpper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden forudsat, at æglægningen er begyndt. Æglægningen begynder cirka 10 dage efter indflyvning til marken.

Bekæmpelse rettet mod de voksne rapsjordløppers bladgnav i fremspiringsfasen kan ikke fastlægges via gule fangbakker. Bekæmpelse rettet mod bladgnav skal man derfor se sig til. Bekæmpelse af bladgnav anbefales frem til at cirka fire løvblade er udviklet, hvis der er over 10 procent bortgnavet bladareal.

- Vær i år særlig opmærksom på tidlige angreb, da rapsudsæden i år ikke er bejdset mod skadedyr eller er bejdset med midler med relativ svag effekt, understreger Ghita Cordsen Nielsen.

I år har der hidtil været relativ få henvendelser om bladangreb, men i denne uge er modtaget flere henvendelser om relativ kraftige angreb i nogle marker. Følg derfor udviklingen med udsigt til varmt og tørt vejr.

jpj