



Registrering af rapsjordløpper i uge 41

Der er udløst bekæmpelse rettet mod larver på ca. 45 procent af lokaliteterne.

Der er i registreringsnettet udstationeret gule fangbakker på ca. 80 lokaliteter for at følge forekomsten af rapsjordløpper og vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordløppers larver.


Bekæmpelse rettet mod larver anbefales ved en samlet fangst på 25 rapsjordløpper pr. fangbakke indenfor 3 uger i hovedflyvningsperioden, forudsat at æglægningen er begyndt.

Der er stor variation i fangsterne. Pt. har tærsklen været overskredet på ca. 45 procent af lokaliteterne. Aktiviteten er igen aftaget i forhold til ugen før.

I figur 1 nedenfor er forekomsten i år sammenlignet med tidligere år.

Pyrethroiderne Karate (0,2 kg pr. hektar), Kaiso Sorbie (0,1 kg pr. hektar), Nexide CS (0,06 liter pr. ha), Cythrin 500 (0,04 l pr. ha) og Cyperb 100/100 W (0,2 liter pr. ha) er godkendt til bekæmpelse af rapsjordløpper. Med de nye afgifter er Karate og Kaiso Sorbie billigst. Der er kun få erfaringer med nedsatte doser. Ved mange rapsjordløpper og en lang flyveperiode kan der være behov for to behandlinger rettet mod larveangreb.

Se [data og uddybende kommentar](#).



Figur 1. Fangster af rapsjordløpper i gule fangbakker i efterårene 2008-2014. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som du nuværende runde fangbakker).

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, hvis du vil vide mere om dette emne.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'