



[Hjem](#) > [Promilleafgiftsfonden](#) > [2014](#) > [Optimering af dræning](#) > [Fordampning](#)


Fordampning

Figuren viser den potentielle fordampning i løbet af året baseret på vejret og for valgt postnr.

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Du kan se den potentielle fordampning for dit eget område ved at vælge postnr. under figuren.

Eksempel på varsling fra 16. september 2014:



Forklaring til modellen og figuren

Engrapgræsgalmyggens larver overvintrer i jorden i marker med engrapgræs. Når den nødvendige udviklingstemperatur er nået omkring primo til medio maj klækkes galmyggene.

Forudsigelsen af tidspunktet for flyvning baseres på en graddags-model med basistemperatur 4,8 °C med varsling ved 110 graddage summeret fra den 1. januar. Der er dog en vis risiko fra 102 graddage. Modellen siger noget om flyvetidspunkt og ikke noget om forventet angrebsstyrke.

Figuren viser forventet tidspunkt for æglæggende engrapgræsgalmyg i år. Til sammenligning vises graddage for de to seneste år.

Normalvejret angiver kurvens forventede forløb, hvis vejret svarede til gennemsnittet af årene 1961-1990.

Figuren viser risikoen for æglæggende skulpegalmyg fra den 1. april for i år. Til sammenligning vises graddage for de to seneste år.

Normalvejret angiver kurvens forventede forløb, hvis vejret svarede til gennemsnittet af årene 1961-1990.