



[Hjem](#) > [Promilleafgiftsfonden](#) > [2014](#) > [Udnyttelse af viden om natur](#) > **OML-beregninger af lugt på grundlag af 10 års vejrdata**

OML-beregninger af lugt på grundlag af 10 års vejrdata

Anvendelse af 10 års vejrdata i selvstændige OML-beregninger af lugt giver langt større sikkerhed i beregningerne og medfører en skarpere tolkning af genegrænsen. Promilleafgiftsfonden for landbrug

Specielt i nordlig og sydlig retning kan der opnås op mod en halvering af genegrænsen, mens genegrænsen i østlig og til dels vestlig retning typisk er uændret eller eventuelt marginalt skærpet i forhold til beregninger i IT-ansøgningssystemet.

Miljøstyrelsen har opdateret Wikivejledningens afsnit 8.1 og 8.2, da det i februar blev muligt at erstatte den nuværende standardberegning af lugt i Husdyrgodkendelse.dk med en ny OML-beregning. De nye OML-beregninger er på grundlag af 10 års vejrdata i situationer, hvor det vurderes, at skarp tolkning af genegrænsen vil reducere afstandskraverne specielt i sydlig og nordlig retning.

Se Miljøstyrelsens [Wiki vejledning afsnit 8.1 og 8.2](#) .

Bent Ib Hansen fra Videncenter for Svineproduktion har udarbejdet et notat, der beskriver konsekvenser og baggrund af overgangen til 10 års vejrdata i OML-beregningerne af lugt.

[Notat fra VSP](#)