




[Hjem](#) > [Promilleafgiftsfonden](#) > [2014](#) > [Videnbase og specialrådgivning](#) > [Hvedesorternes modtagelighed for hvedebladplet \(DTR\)](#)

Hvedesorternes modtagelighed for hvedebladplet (DTR)

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Flakkebjerg har i 2013 undersøgt 22 vinterhvedesorters modtagelighed for hvedebladplet (DTR). Aarhus Universitet, Flakkebjerg har i 2013 via et projekt delvis støttet af forædlerne undersøgt 22 vinterhvedesorters modtagelighed for hvedebladplet (DTR). Der har været udsået et forsøg, hvor der indgår 2 rækker pr. sort i fire gentagelser. I forsøget var der udlagt halm med smitsstof af hvedebladplet. Forsøget er bedømt for angreb på 3 tidspunkter i vækstsæsonen, og resultatet ses i figur 1.

Der er begrænset viden om de dyrkede hvedesorters modtagelighed mod hvedebladplet (DTR). Aarhus Universitet, Flakkebjerg har i 2013 via et projekt delvis støttet af forædlerne undersøgt 22 vinterhvedesorters modtagelighed for hvedebladplet (DTR). Der har været udsået et forsøg, hvor der indgår 2 rækker pr. sort i fire gentagelser. I forsøget var der udlagt halm med smitsstof af hvedebladplet. Forsøget er bedømt for angreb på 3 tidspunkter i vækstsæsonen, og resultatet ses i figur 1.

Der er behov for flere forsøg for at inddеле sorterne i modtagelighedsgrupper. Forsøget gentages i 2014.



Figur 1. Angreb af hvedebladplet på fanebladet bedømt på vs. 75. LSD₉₅ værdien er 9,1.



Angreb af DTR. Angrebene starter som små peberkornagtige pletter, som derefter breder sig og bliver mere udflydende.