



Hjem > Promilleafgiftsfonden > 2014 > Videnbase og specialrådgivning > Vejledende niveauer for Fusariumtoksinerne HT-2 og T-2 i korn

Vejledende niveauer for Fusariumtoksinerne HT-2 og T-2 i korn

EU Kommissionen har henstillet, at forekomsten af fusariumtoksinerne HT-2 og T-2 ikke overskrider bestemte niveauer, men der er endnu ikke vedtaget grænseværdier. Korn i Danmark har oftest et meget lavt indhold af HT-2 og T-2. Promilleafgiftsfonden for landbrug

EU fastlagde i 2006 grænseværdier for fusariumtoksinerne DON (deoxynivalenol) og ZEA (zearalenon) i korn til human ernæring. Der er også fastlagt vejledende grænseværdier for de to toksiner i korn til foderbrug. Se nærmere i [planteavlsorientering 181, 2013](#).

EU Kommissionen har nu henstillet, at forekomsten af fusariumtoksinerne HT-2 og T-2 ikke overskrider niveauerne angivet i oversigt 1. Der er ikke tale om endelige grænseværdier, da man endnu ved for lidt om udbredelsen og betydningen af disse to toksiner. Medlemslandene skal nu årligt indberette niveauerne. I 2015 vil der blive gjort status og sikkert også fastlagt grænseværdier for disse to toksiner.

I Danmark følges udbredelsen af toksinerne HT-2 og T-2 i forskellige kornarter i den årlige monitoring af fusariumtoksiner. Se tabel 7-8 i [planteavlsorientering 181, 2013](#). Det fremgår, at HT-2 og T-2 er mest udbredt i havre og vårbyg, men selv her ligger indholdet oftest på et meget lavt niveau og langt under de angivne niveauer i oversigt 1.

3.4.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 91/15

BILAG

Vejledende niveauer for korn og kornprodukter (*) (**)

	Vejledende niveauer for summen af T-2 og HT-2 (mg/kg), fra og med hvilke der bør foretages en undersøgelse, under alle omstændigheder ved gentagne konstatninger af forekomst (*)
1. Uforarbejdet korn (**)	
1.1. Byg (herunder malbyg) og majs	200
1.2. Havre (med skal)	1 000
1.3. Hvede, rug og andre kornarter	100
2. Korn til direkte konsum (****)	
2.1. Havre	200
2.2. Majs	100
2.3. Andre kornarter	50
3. Kornprodukter til konsum	
3.1. Havrekliid og havreflager	200
3.2. Kornkliid, bortset fra havrekliid, andre formalede havreprodukter end havrekliid og havreflager og formalede majsprodukter	100
3.3. Andre formalede kornprodukter	50
3.4. Morgenmadscerealier, herunder formalede kornflager	75
3.5. Bød (herunder smilagsbød), kager, kiks, snacks baseret på cerealier, pasta	25
3.6. Fødevarer baseret på cerealier til spædbørn og småbørn	15
4. Kornprodukter til foder og foderblandinger (*****)	
4.1. Formalede havreprodukter (skal)	2 000
4.2. Andre kornprodukter	500
4.3. Foderblandinger, med undtagelse af kalfoder	250

(*) De niveauer, der er omhandlet i dette bilag, er vejledende niveauer, fra og med hvilke der bør foretages en undersøgelse — under alle omstændigheder ved gentagne konstatninger af forekomst — af de toksiner, der fører til forekomsten af T-2 og HT-2 i korn, eller videresættelse af foder- og foderblandinger. De vejledende niveauer er baseret på de data om forekomst, som findes i EFSA's database som fremlagt i EFSA's websteds. De vejledende niveauer er ikke foder- og foderprodukt-niveauer.

(**) I forbindelse med denne henstilling er der ikke medtaget i korn, og tilspilskorn er ikke medtaget i kornprodukter.

(***) Uforarbejdet korn er korn, der ikke har undergået anden fysisk eller kemisk behandling end høstning, rensning og sortering.

(****) Korn til direkte konsum er korn, der har undergået sortering, rensning, afblækning og sortering, og som ikke vil skulle undergå yderligere rensning og sortering inden den videre forarbejdning i foderindustrien.

(*****) De vejledende niveauer for korn og kornprodukter, der er bestemt til foder og foderblandinger, gælder for foder med et vandindhold på 12 %.

Kilde: [Kommissionens henstilling om forekomsten af T-2 og HT-2-toksin i korn og kornprodukter](#)