

PLANTEFOKUS



PLANTEAVL
Kontakt: Kaj Lund Sørensen
kls@effektivtlandbrug.dk
61 20 96 67



På arealer med sædskiftegræs skal man være meget kritisk, når græsset vurderes. Der bør ikke være større pletter med dødt græs, medmindre der er en særdeles god bestand af hvidkløver, som kan erstatte produktionen, anbefaler Videncentret. (Foto: Kaj Lund Sørensen)



Giv græsmarken et forårseftersyn

Hold græsarealerne under observation i den kommende periode. Det skiftende vejr med lave temperaturer om natten og solskin om dagen kan være hårdt for græsmarkerne, lyder rådet fra landskonsulenter.

I år ser det ud til, at det bliver tidligt forår. Græsmarkerne er grønne, og der er begyndende vækst.

I skrivende stund ser græsarealerne godt ud. Det er dog nødvendigt at holde græsarealerne under observation i den kommende periode. Skiftende vejr med lave temperaturer om natten og solskin

om dagen kan være hårdt for græsmarkerne.

Det skriver landskonsulenterne Karsten Attermann Nielsen og Martin Mikkelsen i PlanteNyt 967.

Tjek, om der er liv

Vurdér bestanden af kløver, og om der skal sendes bud efter muldvarpejægeren, for desværre er de små lødne dyr også i forårshumør, tilføjer de.

Et forårstjek af græsmarkerne er en nødvendig aktivitet i begyndelsen af marts, for at se om der er pletter, der skal renoveres med en tidlig isåning.

Normalt er nye hvide rødder det første tegn på liv i planterne, men de første livstegn over jorden bør følges tæt fra begyndelsen af marts.

Sådan vurderes plantebestanden

På arealer med sædskiftegræs skal man være meget kritisk, når græsset vurderes. Der bør ikke være større pletter med dødt græs, medmindre der er en særdeles god bestand af hvidkløver, som kan erstatte produktionen, anbefaler konsulenterne.

Pletter større end 20 gange 30 centimeter er for meget. Med hensyn til overfladedækning bør der generelt maks. mangle fem procent på arealer med græs og maksimalt 10 procent på arealer med kløvergræs.

Tæl de overlevende græsplanter i sårækken. Til afgræsning bør der være 30-40 og til slået 20-25 planter pr. meter sårække.

Plantebestand i varigt græs

På arealer med varigt græs gælder samme krav til overfladedækning med græsser, som på sædskiftearealerne. Her kan man ikke tælle græsmarksplanterne i rækker, så der er kravene 300-400 planter pr. kvadratmeter på arealer til afgræsning og 200-300 planter pr. kvadratmeter på arealer til slået.

Isåning i eksisterende marker

I yngre græsmarker – for eksempel i 1. brugsår – kan en tynd bestand af græs med mindre pletter repareres ved isåning af nyt græs eller kløvergræs, hvis det udføres først i april.

På ældre græsarealer med betydelige vinterskader er udbyttet af en isåning for dårligt. Den skal pløjes.

På almindelige lette jordtyper kan isåningen ske med en almindelig radsåmaskine, hvis såskærerne strammes godt op, og der tromles efterfølgende.

På svære jordtyper bør man anvende en såmaskine med skiveskær, for eksempel af Wæderstad typen.

kls

Normal forårspleje af græsmarken

Er græsarealet i orden, kan man gøre klar til at optimere græsmarksdriften efter følgende tjekliste:

Pletter uden græs repareres ved isåning.

På økologiske bedrifter, hvor bestanden af kløver er for lav/mangler på grund af eksempelvis bladrandbiller i udlægsåret 2013, kan en meget tidlig isåning af tre til fire kg kløver pr. hektar udføres i marts måned.

Troml arealet for småsten, som er løftet op af frosten, og udjævn eventuelt muldskud, når jorden er så tør, at traktoren og tromle ikke laver skader på græsmarksplanterne. I de senere år er der set betydelige skader på græsmarksbælgplanterne – især på lucerne og også en del på rødkløver.

Er tromlen forsynet med en strigle og udjævningsplanke, må striglen ikke gå så

dybt, at den river udløberne på hvidkløver op, og udjævningsplanken må ikke klemme og presse græsset, som let kan skades. I år burde det ikke være nødvendigt at anvende en strigle på i de overvintrende marker. Den kan kun gøre skade når der ikke er vissen græs.

Skulle der være pletter med vissent græs, bør det afpudses, så det ikke hindrer for solens indstråling.

Lav en strategi mod muldvarpe. Der er mange i år, og de kan blive en plage. Flere landmænd har en fast aftale med en muldvarpejæger eller en ældre nabo, som koncentrerer sig om de små lodne dyr, så kvægbrugerne kan koncentrere sig om de dyr, der giver mælk.

PlanteNyt 967

Naturerhverv.dk



Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne



Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)