



[Hjem](#) > [Promilleafgiftsfonden](#) > [2014](#) > [Videnbase og specialrådgivning](#) > [Vær opmærksom på mangel på bor i roer](#)

Vær opmærksom på mangel på bor i roer

Mangel ses især under tørre forhold, ved højt reaktionstal og på lette jorde.

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der er øget risiko for bormangel under tørre forhold på sandjord med et relativt højt reaktionstal. Jordenes indhold af bor er lavest på sandjord, og tilgængeligheden af bor aftager meget med stigende reaktionstal.


Bor kan udvaskes fra jorden. Især i tørre vækstsæsoner skal man være opmærksom på bormangel, fordi bor optages af rødderne sammen med vand.

Derudover har mange, der dyrker roer til foder og bioenergi, skiftet fra roesorter med en farvet rod til roer, der har en hvid rodfarve. Erfaringer viser, at sorter med hvid rodfarve og et højt indhold af tørstof er mere udsatte for mangel på bor.

I roer ses symptomerne først som gule blade i hjerteskuddet, som efterhånden bliver sorte, og hjerteskuddet kan helt "dø" væk. Der opstår også en tørforrådnelse i roelegemet.



Billede 1 Bormangel i roer. Sent i sæsonen (arkivfoto).



Billede 2. Tydelige bladsymptomer på bormangel i roer (arkivfoto).

På nuværende tidspunkt kan bormangel forebygges eller afhjælpes ved udsprøjtning af 3-5 kg Solubor pr. ha. Dette anbefales, hvor der ikke er anvendt borholdige gødninger ved såning, og i marker, hvor der er risiko for bormangel.

Bor indgår også i flere midler med mikronæringsstoffer, men det er oftest i små mængder. Der kan alternativt udsprøjtes Bittersalt microtop. Se [PlanteNyt nr. 1035, 2014](#).

Solubor kan ifølge firmaet blandes med Opera hhv. Opus. Se nærmere om svampebekæmpelse i bederoer i [PlanteNyt nr.1115, 2014](#).

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.