



ANGREB AF STANKELBENLARVER

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der er meldt om angreb af stankelbenlarver i flere forårssåede afgrøder. Majs og ærter er de mest robuste afgrøder mod stankelbenangreb. Der er ingen muligheder for bekæmpelse om foråret.

De seneste uger er der meldt om angreb af stankelbenlarver i vårbyg og andre forårssåede afgrøder. Der er ikke længere kemiske løsninger til rådighed til bekæmpelse af stankelben om foråret.

Miljøstyrelsen har i tidligere år givet dispensation til brug af Danadim Progress i græs, men grundet den nye afgift blev prisen for en bekæmpelse for høj nemlig over 2100 kr./ha. I efteråret 2014 blev der givet en mindre anvendelse til fremover at bruge 0,45 l/ha Avaunt i græs om efteråret. Se yderligere i [PlanteNyt nr. 1898, 2014](#). Forårsanvendelse er ikke søgt, fordi der ikke foreligger forsøg, og fordi tyske erfaringer tyder på for ringe effekt ved forårsanvendelse.

Der kan desværre ikke anvises andre alternative metoder med væsentlig effekt. Tromling har en vis effekt, men der er meget blandede tilbagemeldinger fra praksis hermed.

UDSATTE MARKER

Stankelbenene ligger æg i græs i august til primo september. Kort græs foretrækkes. Angreb er derfor knyttet til græsdyrkning i august til primo september.

Normalt findes der flest stankelben i 2. og 3. års græsmarker, der har været afgræsset. Larverne er mest udbredt på humus-, sand- og marskjorder.

HVORNÅR KAN DER SÅS OM ?

Stankelben forpupper sig normalt omkring Sankt Hans, og aktiviteten aftager omkring Grundlovsdag. Grundet det milde efterår og vinter forpupper larverne sig nok lidt tidligere i år, så der kan omsås fra omkring 1. juni.

Alle afgrøder angribes, men erfaringerne er, at majs og ærter er mere robuste end de øvrige afgrøder. Hvis der sås majs, kan der omsås allerede nu, fordi afgrøden er mere robust, men der vil også komme angreb i mindre omfang i majs.

I majs har bejdsemidlet Sonido tidligere været solgt, men udbydes ikke længere. Midlet har nogen effekt på både smelder- og stankelbenlarver. En stor ulempe ved bejdsen er dog, at der ikke samtidig kan bejdses med Mesurol til at repellere fugle, da det kan påvirke spireevnen.



Billede 1. Stankelbenlarver.



Billede 2. Nærbillede af stankelbenlarve.



Billede 3. Angreb af stankelbenlarver i en vårbygmark efter græs. Bemærk, at der er mindre angreb i forageren, hvor jorden er mere fast. Tromling kan dog desværre oftest ikke give samme effekt.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.