

EFFEKT AF SVAMPEMIDLER I FRØGRÆS

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

De godkendte midlers effekt er inddelt efter en 0-3 skala mod de enkelte svampesygdomme.

Der er nu også udarbejdet en oversigt over effekter af godkendte svampemidler i frøgræs. Oversigten ses nedenfor og er udarbejdet i samarbejde med Aarhus Universitet på baggrund af hovedsagelig danske forsøg.

Tabel 1. Oversigt over godkendte midler i frøgræs. 1-3 skala, hvor 0 = ingen effekt, 1 = svag effekt, 2 = middel effekt og 3 = god effekt.

Middel	Godkendt i	Normal-dosis, l/ha	Maks. antal behandlinger pr. vækstsæson	1,0 l bidrager i triazol-regnskab med, procent	Opfod-ring tilladt	Effekt sortrust, brunrust, gulrust, (1-3 skala)	Effekt kronrust, engrapgræs-rust (1-3 skala)	Effekt bladplet (Drechs-lera og Mastigo-sporium) (1-3 skala)	Effekt meldug (1-3 skala)
Amistar/Mirador	Frøgræs	1,0	2	0	Ja	xx	x	xxx	x**
Approach	Frøgræs	0,96	1	0	Nej	xx	x	xxx	x**
Bell	Rajgræs, strandsvinkel, engrapgræs, hundegræs	1,5	Ingen restriktioner	54	Nej	xxx	xxx	xxx	xx
Bumper	Frøgræs	0,5	2	100	Nej	xx	xx	xx	xx
	Rajgræs, strandsvinkel								

Ceando/ Tilt	strandsvin- gel, engrapgræs, hundegræs	1,5	Ingen restriktioner*	67	Nej	xxx	xxx	xxx	xxx
Comet	Rajgræs, strandsvin- gel, engrapgræs, hundegræs	1,0	2	0	Nej	xx	x	xxx	x**
Comet Pro	Rajgræs, strandsvin- gel, en- grapgræs, hundegræs, engsvingel, rødsvingel, bakkesvin- gel	1,25	2	0	Nej	xx	x	xxx	x**
Orius	Frøgræs	1,25	Ingen restriktioner	80	Nej	xxx	xxx	xxx	xx(x)

* Anbefales kun brugt 1 gang pr. sæson for at forsinke resistensudviklingen hos meldug mod midlet.

** Ukendt om der er fuld effekt på meldug af strobiluriner.

Kilde: [Resultater fra forsøg ved Aarhus Universitet](#).