



FOREBYG SKADEDYR I KORNLAGERET

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Rengør kornlageret grundigt nu, hvor beholdningerne er små, og før den nye høst tages ind.

Kornsnudebiller og andre skadedyr kan gøre skade på det lagrede korn i kornsiloer og andre lagerrum. For at forebygge angreb skal kornlageret derfor rengøres grundigt nu, hvor beholdningerne er små, og før den nye høst tages ind. Alt gammelt korn og melstøv fjernes fra både silo og lagerrum og fra de tilhørende transport- og indtagningsfaciliteter. Det er vigtigt at foretage en god rengøring med kost og støvsuger før en eventuel kemisk bekæmpelse.

KEMISK BEKÆMPELSE I TOMME KORNLAGRE

K-Obiol EC 25 er godkendt til bekæmpelse af kornskadedyr i tomme kornlagre.

Midlet udbringes med rygsprøjte, og der anvendes følgende doser:

- grove overflader: 30 ml K-Obiol opløses i 5 l vand. 5 l opløsning rækker til 50 m² overflade,
- jævne overflader: 60 ml K-Obiol opløses i 5 l vand. 5 l opløsning rækker til 100 m² overflade.

For at få maksimal effekt skal behandlingen ske på rengjorte overflader. Midlets virkningstid er 6-16 uger afhængig af overfladens beskaffenhed, længst på glatte overflader og kortest på porøse overflader og beton. Mod risemelbillen, som er langt mindre udbredt end kornsnudebiller, er virkningstiden 4 uger.

Midlet må maksimalt anvendes 1 gang pr. år.

K-Obiol EC 25 koster omkring 800-900 kr. pr. l inkl. afgift ekskl. moms.

Derudover er AquaPy (naturligt pyrethrum fra Chrysanthemum) godkendt til skadedyrsbekæmpelse i tomme kornlagre.

AquaPy er godkendt til bekæmpelse af den voksne kornsnudebille og andre kravlende insekter i tomme kornlagre. Midlet virker kun få timer, og insekterne skal derfor rammes direkte.

Doseringen for AquaPy er:

-0,5 l blandes med 4,5 l vand, og det rækker til 100 m².

Behandling udføres to gange med omkring en times mellemrum. Første behandling har også til formål at aktivere billerne.

KEMISK BEKÆMPELSE I KORN

K-Obiol ULV 6 er godkendt mod kornsnudebiller til brug i selve kornet med 4,2 l pr. 100 tons korn. Bayer oplyser, at midlet kun forhandles i 1000 liters beholdere.

Midlet må maksimalt anvendes 1 gang pr. parti.

GASNING

Større anlæg og større kornpartier kan eventuelt "gasses" med et fosforbrinteprodukt. Kun firmaer med særligt udstyr og speciel tilladelse må foretage denne behandling. For eksempel Anticimex, tlf. 7514 5822, Mortalin, tlf. 70151069 og Nomus, tlf. 8643 0100.


STYRING AF KORNLAGERET

Er du interesseret i at vide mere om styring af kornlageret, og hvordan høsten bør behandles efter indlagring, se [vejledning](#).

SKADEDYRENES UDSEENDE OG BIOLOGI

På Aarhus Universitets hjemmeside under [Spørg om skadedyr](#) findes yderligere oplysninger om skadedyrenes udseende og biologi.

Skadedyr i kornlagre er især [kornsnudebiller](#), [savtakket kornbille](#), [australsk tyvbille](#), [rismelbiller](#), [melbiller](#), [lagermider](#) og [frømol](#). Se også billeder nedenfor.





Billede 1. Kornsnudebille.



Billede 2. Kornsnudebille. Bemærk de gnavede huller i kernerne.



Billede 3. Mider i rapsfrø. Angreb ses især i de øverste få cm i overfladen på lageret, hvor der kan være dannet kondens. Problemet løses derfor ved at få frøene tørre også i det øverste lag.



Billede 4. Nærbillede af mider i rapsfrø. Angreb ses især i de øverste få cm i overfladen på lageret, hvor der kan være dannet kondens.



Billede 5. Frømollets larver.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.