

KNÆKKEFODSYGE I NOGLE RUG- OG HVEDEMARKER

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Den tidlige såning, den milde vinter og det fugtige forår har fremmet knækkefodsyge.


Den sidste uges tid er modtaget flere meldinger om angreb af knækkefodsyge i både vinterhvede og rug. I små områder af marken ses lejesæd eller planter der hælder. I nogle marker ses også enkeltstrå, der hælder og forsøger at rette sig op. Se billederne nedenfor, som alle er fotograferet i uge 26.

Knækkefodsyge var også i 2014 mere udbredt end normalt, men ellers har sygdommen de sidste mange år optrådt med overvejende svage og ubetydelige angreb. Knækkefodsyge fremmes af tidlig såning, milde vintre samt et fugtigt forår, dvs. netop de vejrforhold, som vi har haft i år.

Knækkefodsyge kan overleve op til tre år på planterester af korn. Angreb ses derfor i marker med vintersædsdyrkning inden for de seneste år. Nedpløjning af angrebne planterester og opløjning året efter kan således give risiko for smitte.

Angreb af knækkefodsyge kan senere også vise sig som nødmodne enkeltstående planter tilfældigt i marken. Nødmodne enkeltplanter kan dog også skyldes angreb af goldfodsyge eller andre årsager.

Flere midler har nogen effekt mod knækkefodsyge, men effektive løsninger savnes. Se [PlanteNyt nr.2025](#).





Billede 1. Rugplanter hælder pga. angreb af knækkefodsyge.





Billede 2. Væltede rugstrå grundet knækkefodsyge. Planterne forsøger at rette sig op. Store nedbørsmængder kan også få sunde planter til at vælte.



Billede 3. Knækkefodsyge i rug. Bladskeden er fjernet for at se symptomerne.



Billede 4. Nærbillede af samme strå som på billede 3.





Billede 5. Knækkefodsyge i hvede. Bemærk de små sorte prikker (stroma) som tit ses, når bladskeden fjernes.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.