



HOLD ØJE MED LARVER AF MAJSHALVMØL

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Majshalvmøllet breder sig i Danmark, og i 2014 forekom de hidtil mest udbredte angreb. Skadedyret optræder i de sydøstlige egne af landet. Det første tilfælde af laveangreb i år er nu fundet på Falster.

Majshalvmøllet breder sig i Danmark, og i 2014 forekom de hidtil mest udbredte angreb. Skadedyret optræder i de sydøstlige egne af landet. Det første tilfælde af laveangreb i år er nu fundet på Falster. Se billeder nedenfor.

For at vurdere betydningen af skadedyret bør man holde øje med evt. angreb, når man i efteråret færdes i majsmarker. Nødmodne og knækkede stængler er på afstand det mest tydelige symptom.


Se yderligere om biologi og bekæmpelse i [PlanteNyt nr. 1162](#).





Billede 1. Angreb efter majshalvmøllarve i majscolbe fotograferet primo september 2015.
Foto: Louise Lund, DLS





Billede 2. Angreb efter majshalvmøllarve i majsstængel fotograferet primo september 2015.
Foto: Louise Lund, DLS



Billede 3. Majshalvmøllarve.





Billede 4. Knækket stængel grundet angreb af majshalvmøllarve.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.