



MANGE SKULPESNUDEBILLER I FLERE VINTERRAPSMARKER

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Ved sprøjtning om dagen kan 0,2 l/ha Biscaya anvendes. Midlet må kun bruges 1 gang pr. vækstsæson.

Der er i flere tilfælde meldt om mange skulpesnudebiller i vinterraps i den forløbne uge. Se billeder nedenfor. Skulpesnudebillerne skader ved at skabe indfaldsveje for skulpegalmyggene, men de kan ved større tætheder også skade uden forekomst af skulpegalmyg. Der kan trænge vand ind i snudebillernes huller, hvilket kan føre til angreb af sekundære svampe og nødmodning.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for skulpesnudebiller er 6 biller pr. plante. Skulpesnudebillerne falder tit af, når planterne berøres, så ryst evt. planterne ned i en bakke el.lign. Skulper under 2 cm kan angribes af skulpegalmyg alene uden hjælp fra skulpesnudebiller.

I tabel 1 ses en oversigt over normaldosier for godkendte midler i raps. Det fremgår, at såfremt man ikke har midler på lager, så er Karate og Biscaya efterfulgt af Kaiso Sorbie og Fastac de billigste løsninger med de nye afgifter. Der findes kun få forsøg med nedsatte doser mod skadedyr i raps. Da rapsen (uanset dosis) ret hurtigt er ubeskyttet, anbefales det mod skulpesnudebiller og skulpegalmyg at anvende nedsatte doser - dvs. 50-75 pct. af normaldosering. Vær opmærksom på, at normaldosis af Fastac 50 mod skadedyr i raps efter revurderingen er nedsat fra 0,25 til 0,15 l pr. ha, hvorfor det ikke anbefales at reducere dosis for dette middel.

Hvis man vil sprøjte om dagen, er kun 0,2 l/ha Biscaya en mulighed, da de øvrige midler i tabel 1 har bimærke. Biscaya må kun anvendes 1 gang pr. vækstsæson. Er Biscaya allerede brugt, bliver man nødt til at anvende de godkendte pyrethroider.

Mavrik må som det eneste pyrethroid udsprøjtes om dagen, men midlet er kun godkendt mod glimmerbøsser. Ifølge firmaet forventes Mavrik efter revurderingen også at få skulpesnudebiller og skulpegalmyg på etiketten.

Forventet flyvetidspunkt for skulpegalmyg (oftest omkring begyndende blomstring) kan følges på Landbrugsinfo.dk/regnet. Denne temperaturmodel oplyser kun om forventet flyvetidspunkt og siger ikke noget om angrebsstyrken. På samme side kan forekomsten af skulpegalmyg i fangbakker på 15 lokaliteter følges, men 15 lokaliteter er ikke tilstrækkelig til at afgøre angrebsstyrken generelt i Danmark.

Tabel 1. Normaldoser for godkendte skadedyrsmidler i raps.

Skulpesnudebiller	0,15	0,3	0,15	0,25	0,05	0,06	0,3
Skulpegalmyg	0,15	0,3	0,15	0,25	0,05	0,06	-
Max. antal behandlinger pr. vækstsæson i raps	2	3	1	1	1	3	1
Pris, kr. pr. normaldosis (inkl. ny afgift, ekskl. moms)	96**	142	162	417-422	401	392	137

** Normaldosis er efter revurderingen nedsat fra 0,25 til 0,15 l pr. ha, hvorfor det ikke anbefales at reducere dosis af dette middel.

Se yderligere i [PlanteNyt nr. 2067, 2015](#).



Billede 1. Skulpesnudebiller i vinterraps fotograferet 7. maj, 2015. Foto: Kenneth Svensson, Gefion.



Billede 2. Udgangshul i rapsskulpe efter skulpesnudebille.



Billede 3. Angreb af sekundære svampe efter angreb af skulpesnudebiller.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.
