



"INVASION" AF SKULPESNUDEBILLER

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

De mange skulpesnudebiller viser, at der tidligere har været larveangreb i vinterraps og andre korsblomstrede afgrøder.

De sidste par uger er der modtaget mange henvendelser fra både konsulenter, landmænd og private om store forekomster af skulpesnudebiller på korsblomstrede planter i marker og i haver. Se fotos nedenfor.

Skulpesnudebiller har én generation om året. Den overvintrer som voksen i hegn o. lign. og angriber i foråret vinterraps og andre korsblomstrede planter under blomstring. Den ligger æg i skulperne, og ægget klækker efter 8-9 dage, hvorefter larven gnaver på frøene i 3-5 uger. Herefter borer larven sig ud af skulpen og forpupper sig i jorden. I juli-august fremkommer den nye generation, som efter lidt gnav på korsblomsterne igen går til overvintring i hegn i løbet af august.

At der pt. er mange skulpesnudebiller viser, at der er udviklet mange larver i vækstsæsonen 2015. I flere vinterrapsmarker sås også mange skulpesnudebiller i foråret. Se nærmere i [PlanteNyt nr. 2081](#).

På nuværende tidspunkt ses de angrebne skulper også mere eller mindre udbredt i flere vinterrapsmarker. Se fotos nedenfor.

På skulperne ses larvens ca. 1 mm udboringshul. Der lægges normalt kun 1 æg pr. skulpe, og hver larve ødelægger 3-6 frø pr. skulpe. Skulperne nødmodner tit ved angreb, og sekundært kommer der angreb af gråskimmel og sortskimmelsvampe. Da der kan trænge vand ind i skulperne i larvens udgangshul, optræder der ofte også sekundære angreb af gråskimmel og sortskimmelsvampe på frøene i nærheden af udgangshullet. Frøene i nærheden af hullet kan også godt spire.

Skulpesnudebillerne kan på nuværende tidspunkt bl.a. findes på korsblomstrede efterafgrøder,


men de forårsager normalt ikke skade på nuværende tidspunkt. Ved meget store forekomster kan væksten hæmmes.



Billede 1. Kraftige angreb af skulpesnudebiller på olieræddike fotograferet 10. august på Sydfyn. I denne mark var væksten hæmmet som følge af angrebene. Foto: Lars Falch Bønløkke, Landbrugsrådgivning Syd.



Billede 2. Nærbillede af skulpesnudebille på rapsskulpe.





Billede 3. Rapsskulpe med udgangshul efter skulpesnudebillens larve. Skulpen er nødmodnet, og der er sekundære angreb af gråskimmel og sortskimmelsvampe. Øverst kan anes en uangrebet skulpe, der er lysebrun. Fotograferet 12. august.



Billede 4. Nærbillede af skulpesnudebillens udgangshul, fotograferet den 12. august.





Billede 5. Her er der trængt vand ind i larvens udgangshul, og der er kommet angreb af sekundære svampe på frøene. Fotograferet 12. august.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.