



NYT OM SKADEGØRERE I REGISTRERINGSNETTET I VINTERSÆD OG FRØGRÆS I UGE 18

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

I hvide er optælling af dage med nedbør startet for at vurdere behovet for Septoriabekæmpelse

Vinterbyg. Angrebene af bygrust har igen bredt sig i hybridsorterne Trooper og Wootan, hvor der er fundet angreb i ca. 40-65 procent af markerne. Fra praksis er også meldt om meget bygrust i hybridsorten SY LEOO, som ikke indgår i registreringsnettet. I Matros og KWS Meridian er der kun fundet bygrust i ca. 15 procent af markerne.

Skoldplet og meldug har bredt sig i den forløbne uge. Der er pt. ingen tydelige sortsforskelle på angrebene af skoldplet, mens mest meldug ses i Padura, hvor meldug har udløst bekæmpelse i 10 procent af markerne.

Bygrust og meldug bekæmpes i modtagelige sorter ved over 10 hhv. 25 procent angrebne planter. Anvend f.eks. 0,25 l Prosaro, 0,2 l Proline, 0,25 l Folicur Xpert, 0,3 l Orius, 0,25 l Folicur eller 0,25 l Rubric/Maredo/Opus (ikke ved meldug), hvor Proline, Prosaro eller Rubric/Maredo/Opus foretrækkes, hvis der også er skoldplet.

Det gennemsnitlige vækststadium er 32 (variation 30-37).

Triticale. Gulrust er mest udbredt og er fundet i 50 procent af markerne. Der er fundet angreb i alle 3 sorter (Gringo, Ragtac, Jura), som indgår i registreringsnettet og fundet op til 75 procent angrebne planter.

Meldug er mindre udbredt, og der er udløst meldugbekæmpelse i ca. 5 procent af markerne.

Gulrust bekæmpes ved angreb med f.eks. 0,25-0,3 l Orius eller 0,2-0,25 l Folicur. Vær især ved tidlige gulrustangreb opmærksom på de nye triazolregler, hvor der sammenlagt kun må

benyttes en normaldosering af triazoler pr. vækstsæson. Anvend evt. en blanding af Orius/Folicur og strobilurinet Comet/Comet Pro.

Det gennemsnitlige vækststadie er 31 (variation 30-33).

Vinterhvede. Der er fundet gulrust i Substance ved Kolding, Horsens og Middelfart (0,01-50,0 procent angrebne planter). Fra praksis er i denne uge også meldt om meget kraftige gulrustangreb i Substance på Ærø. Tidligere er også meldt om angreb af gulrust i Substance ved Haderslev og Tystofte. I JB Asano er fundet gulrust ved Tystofte og i KWS Cleveland ved Kolding.

Meldug er mindre udbredt. Mest er fundet i Mariboss, hvor der er udløst bekæmpelse i 10 procent af markerne.

Til bekæmpelse af gulrust, meldug og Septoria kan f.eks. anvendes 0,25-0,35 l Prosaro, hvor dosis fastlægges efter smittetryk af Septoria. Hvis der ikke er gulrust kan f.eks. også anvendes 0,2-0,3 l Proline.

Optællingen af dage med nedbør starter i vækststadie 31-32 (1-2 knæ udviklet). 4 dage med nedbør udløser en Septoriabekæmpelse.

Det gennemsnitlige vækststadie er 31 (variation 29-33).

Rug. Skoldplet er fortsat mest udbredt og bekæmpes, hvis der forud har været nedbør, og der er mere udbredte angreb. Til bekæmpelse kan f.eks. anvendes 0,25 l Prosaro, 0,2 l Proline eller 0,25 l Rubric/Maredo/Opus.

Der er fundet svage angreb af brunrust i 1 mark. Fra praksis er der i den forløbne uge meldt om brunrust i to rugmarker. Se billede 1 nedenfor. Meldugangrebene er svage.

Det gennemsnitlige vækststadie er 33 (variation 32-37).

Engrapgræs. Der er fundet begyndende angreb af rust i flere marker. Bekæmpelse af rust anbefales først fra vækststadium 32 (2 knæ udviklet). Det gennemsnitlige vækststadie er 28 (variation 23-32).

Strandsvingel. Der er fundet meldug i flere marker med op til 10 procent dækning. Evt. meldugbekæmpelse er aktuel fra vækststadium 32 ved over 1 procent dækning.

Til meldugbekæmpelse kan anvendes 0,3 l Orius eller 0,25 l Folicur. Det gennemsnitlige vækststadie er 30 (variation 29-32).

Alm rajgræs. Første registrering er foretaget. Der er fundet begyndende angreb af kronrust i mange marker med op til 5 procent dækning. Bekæmpelse af kronrust anbefales fra vækststadium 32. Det gennemsnitlige vækststadie er 29 (variation 24-33).

Nedenfor ses link til registreringerne og uddybende kommentarer til de enkelte afgrøder.

- [Vinterhvede](#)
- [Vinterbyg](#)

- Triticale
- Vinterrug
- Engrapgræs
- Strandsvingel
- Alm. rajgræs



Billede 1. Brunrust i rug fotograferet i uge 17.

Foto Lars Møller-Christensen, Vestjysk Landboforening.

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, hvis du vil vide mere om dette emne.