



NYT OM SKADEGØRERE FRA REGISTRERINGSNETTET I MAJS OG ROER I UGE 33

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Majsøjeplet er mest udbredt, og mest er fundet i de upløjede marker. Evt. bekæmpelse anbefales fra omkring stadium 51 til fuld blomstring ved over 5-10 procent planter med angreb på bladene omkring kolben.

Bladsvampe i majs. Der registreres hver uge angreb af bladsvampe i majs i 27 marker, hvor 18 marker er pløjet og 9 marker er upløjet. Alle marker har forfrugt majs.

Majsøjeplet er mest udbredt og mest er fundet i de upløjede marker. Majsøjeplet trives under kølige (ca. 15-22 °C) og fugtige forhold, mens majsbladplet trives bedst ved lidt højere temperaturer (ca. 20-28 °C) og bladfugt.

Der er fundet majsøjeplet i ca. 60 procent af de upløjede marker (op til 100 procent angrebne planter) og ca. 45 procent af de pløjede marker (op til 100 procent angrebne planter).

Der er på de 2 blade *under* kolben fundet op til 20 procent dækning af majsøjeplet i upløjet og op til 2 procent dækning i pløjet. Der er på de to blade *over* kolben fundet op til 2 procent dækning af majsøjeplet i upløjet og op til 0,5 procent dækning i pløjet.

Bekæmpelse anbefales ved over 5-10 procent planter med angreb på bladene omkring kolben. Hvis der kun er angreb på de nederste blade, udløser dette ikke bekæmpelse.

Evt. bekæmpelse anbefales fra omkring stadium 51 (hanblomsterstand mærkbar) til sprøjtefristen i stadium 65 (fuld blomstring). Til bekæmpelse kan anvendes 0,7 l Opera pr. ha. Der er pt. kun udløst bekæmpelse i meget få marker.

Der er stor spredning på markernes udvikling. De længst udviklede marker er i st. 65 (fuld

blomstring), mens det gennemsnitlige udviklingstrin kun er omkring stadium 53 (spids af hanblomst synlig).

Majshalvmøl. Der er denne uge ikke fundet majshalvmøl på nye lokaliteter. Der er i år fundet enkelte majshalvmøl på Bornholm, Lolland Falster, Syd- og Vestsjælland samt i Sønderjylland.

Dette var sidste registrering af majshalvmøl i år. Vi takker for indberetningerne. Husk at alle limplader efter sidste aflæsning skal indsendes til SEGES jævnfør vejledningen.

Bladsvampe i sukkerroer. NBR Nordic Beet Research, Dansk Landbrug Sydhavsørerne og Nordic Sugar A/S Agricenter bedømmer hver uge angreb af bladsvampe. Der er observeret begyndende angreb af meldug flere steder, og der er udløst bekæmpelse i flere marker.

Se uddybende kommentarer herunder.

[Bladsvampe i majs.](#)

[Majshalvmøl.](#)

[Bladsvampe i sukkerroer.](#)