



6. REGISTRERING AF BLADLUS I VINTERHVEDE OG VINTERBYG I UGE 44

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Angrebene ligger pt. under niveauet i efteråret 2014 og også under niveauet i efteråret 2011, men der er alligevel udløst bekæmpelse i flere tidligt såede marker.


Forekomsten af bladlus følges ugentlig i registreringsnettet i 34 vinterhvede- og 23 vinterbygmarker i dette efterår frem til og med 2.-3. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.


Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere "mørke pletter" på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen.

Der er i både i vinterbyg og hvede fundet i gennemsnit 0,3 procent angrebne planter i de ubehandlede marker, hvilket er på niveau med ugen før. Der er denne uge fundet op til 2 procent angrebne planter i både vinterbyg og hvede. Angrebsstyrken kan sammenholdes med registreringsnettet i tidligere år. Se figur 1-2 nedenfor. Det fremgår, at angrebene pt. er svagere end på samme tidspunkt i efteråret 2014, hvor de hidtil kraftigste angreb optrådte. Angrebene er pt. også svagere end i efteråret 2011.

Der findes ingen vejledende bekæmpelsestærskel for bladlus i vintersæd om efteråret, fordi klimaforholdene resten af efteråret ikke kendes og antallet af bladlus med virusmitte er ukendt. Bekæmpelse skønnes i tidligt såede marker dog nødvendig, hvis der er anslået omkring 2-3 procent angrebne planter. I 8 af de 23 vinterbygmarker og i 11 af de 34 vinterhvedemarker har der indtil videre i år været fundet 2-3 procent angrebne planter på et tidspunkt og dermed været et bekæmpelsesbehov. Selv om kurverne for 2015 således ligger lavt i figur 1-2 i forhold til tidligere år, er der udløst bekæmpelse i flere tidligt såede marker i år.

Se data og yderligere kommentarer i [vinterbyg](#) og [vinterhvede](#).





Figur 2. Udviklingen af bladlus i registreringsnettet i vinterhvede i efterårene 2008-2015.

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, hvis du vil vide mere om dette emne.