



4. REGISTRERING AF BLADLUS I VINTERHVEDE OG VINTERBYG I UGE 42

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der er fundet op til 2 procent angrebne planter i vinterbyg og op til 3 procent angrebne planter i vinterhvede. Angrebene ligger pt. under niveauet i efteråret 2014 og også under niveauet i efteråret 2011.

Forekomsten af bladlus følges ugentlig i registreringsnettet i 37 vinterhvede- og 26 vinterbygmarker i dette efterår frem til og med 2.-3. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

Forekomsten af bladlus følges ugentlig i registreringsnettet i 37 vinterhvede- og 26 vinterbygmarker i dette efterår frem til og med 2.-3. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere "mørke pletter" på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen.


Der er i vinterbyg fundet i gennemsnit 0,3 procent angrebne planter og i hvede 0,7 procent angrebne planter i de ubehandlede marker, hvilket er på niveau med ugen før. Der er fundet op til 2 procent angrebne planter i vinterbyg og op til 3 procent angrebne planter i hvede. Angrebsstyrken kan sammenholdes med registreringsnettet i tidligere år. Se figur 1-2 nedenfor. Det fremgår, at angrebene pt. er svagere end på samme tidspunkt i efteråret 2014, hvor de hidtil kraftigste angreb optrådte. Angrebene er pt. også svagere end i efteråret 2011.


Evt. bekæmpelse anbefales tidligst udført fra omkring 3-4 bladstadiet. En engelsk temperaturmodel anbefaler ved bladlusangreb bekæmpelse ved 170 graddage med basis 3 grader. Opsummering af graddage sker fra fremspiring, og graddageberegneren findes på Landbrugsinfo.dk under "Vejret". Ved fremspiring medio september vurderes bekæmpelse afhængig af lokalitet aktuel fra omkring første uge af oktober.

Forekomst af bladlus i vinterbyg, efterårene 08-15

Uge nr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
39	0	0	0	2	0	0	1	0
40	0	0	0	9	0	0	4	0
41	0	0	0	9	0	0	12	0
42	0	0	0	8	1	0	10	0
43	0	0	0	8	0	0	30	0
44	0	0	0	10	0	0	45	0
45	0	0	0	6	0	0	47	0

Figur 1. Udviklingen af bladlus i registreringsnettet i vinterbyg i efterårene 2008-2015.





Figur 2. Udviklingen af bladlus i registreringsnettet i vinterhvede i efterårene 2008-2015.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.