

10. REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER UGE 44

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Bekæmpelsestærsklen for larveangreb er pt. overskredet på ca. 35 procent af lokaliteterne.

Der er udstationeret gule fangbakker på ca. 75 lokaliteter for at følge forekomsten af rapsjordlopper og vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppens larver.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden.


Forekomsten af rapsjordlopper er aftaget, og der er ikke udløst bekæmpelse på nye lokaliteter i den forløbne uge. Bekæmpelsestærsklen har i år været overskredet på ca. 35 procent af lokaliteterne. Angrebsstyrken har været meget variabel fra lokalitet til lokalitet.


Det vurderes, at bekæmpelse nu er udført i marker med behov og er afsluttet. Ved sen bekæmpelse i november er effekten noget lavere.

I figuren nedenfor kan udviklingen i år sammenlignes med tidligere år. Af de viste år var de kraftigste angreb i efteråret 2008, hvor der var kraftige angreb i mange marker.

Der skal nu ikke foretages flere registreringer i år. Vi takker for indberetningerne.

Se [data og uddybende kommentarer](#).





Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008-2015. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som du nuværende runde fangbakker).

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.