



FØRSTE REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER UGE 35

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der er fundet rapsjordlopper i flere marker, men æglægningen starter først efter ca. 10 dage. Hold øje med bladnav især i ubejdsede marker og marker, der kun er bejdset med Force og Mesurol.

Der er udstationeret gule fangbakker på ca. 75 lokaliteter for at følge forekomsten af rapsjordlopper og vurdere behovet for at bekæmpe angreb af rapsjordloppers *larver*.

De første aflæsninger af fangster er foretaget, og der er fundet rapsjordlopper i flere marker. Æglægningen begynder cirka 10 dage efter indflyvning til marken, og især i varme efterår lægges der mange æg.

Bekæmpelse rettet mod *de voksne* rapsjordloppers bladnav i fremspiringsfasen kan ikke fastlægges via gule fangbakker. Bekæmpelse rettet mod bladnav skal man derfor se sig til. Bekæmpelse af bladnav anbefales frem til at ca. 4 løvblade er udviklet, hvis der er over 10 procent bortgnavet bladareal.

Vær især opmærksom på evt. tidlige angreb i marker, hvor der er anvendt ubejdset udsæd eller hvor der kun er bejdset med Force. Mesurol har også kortere virkningstid end Cruiser RAPS/Modesto FS 480.

Vær også opmærksom på, at der nogle steder i år er set angreb af skulpesnudebiller i vinterrapsen først og fremmest i ubejdsede marker eller hvor der er bejdset med Force eller Mesurol.

Se [data og uddybende kommentarer](#).

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

