



## 2. REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER UGE 36

STØTTET AF

# Promilleafgiftsfonden for landbrug

Bekæmpelse rettet mod larver er pt. ikke aktuel. Hold øje med bladnav især i ubejdsede marker samt marker, der kun er bejdset med Force og Mesurol.

Der er udstationeret gule fangbakker på ca. 75 lokaliteter for at følge forekomsten af rapsjordlopper og vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppers *larver*.

Der er fundet rapsjordlopper i flere marker. Æglægningen begynder cirka 10 dage efter indflyvning til marken, og især i varme efterår lægges der mange æg. Bekæmpelse rettet mod larver er pt. endnu ikke aktuel.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden, forudsat at æglægningen er begyndt.

Bekæmpelse rettet mod *de voksne* rapsjordloppers bladnav i fremspiringsfasen kan ikke fastlægges via gule fangbakker. Bekæmpelse rettet mod bladnav skal man derfor se sig til. Bekæmpelse af bladnav anbefales frem til, at ca. fire løvblade er udviklet, hvis der er over ti procent bortgnavet bladareal.

Vær især opmærksom på evt. tidlige angreb i marker, hvor der er anvendt ubejdset udsæd, eller hvor der kun er bejdset med Force. Mesurol har også kortere virkningstid end Cruiser RAPS/Modesto FS 480.

Se [data og uddybende kommentarer](#).