

7. REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER UGE 41

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Bekæmpelsestærsklen for larveangreb er pt. overskredet på ca. 35 procent af lokaliteterne.

Der er udstationeret gule fangbakker på ca. 75 lokaliteter for at følge forekomsten af rapsjordlopper og vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppens *larver*.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Der lægges flest æg i varmt vejr.


Bekæmpelsestidspunktet rettet mod larver er i et vist omfang fleksibelt. Bekæmpelse anbefales afsluttet indenfor de næste ca. 2 uger. Senere bekæmpelse har også effekt, men effekten er mere svingende. Bekæmpelsestærsklen har i år indtil videre været overskredet på ca. 35 procent af lokaliteterne. Angrebsstyrken er meget variabel fra lokalitet til lokalitet.

I nedenstående figur kan udviklingen i år sammenlignes med tidligere år. Af de viste år var de kraftigste angreb i efteråret 2008, hvor der var kraftige angreb i mange marker.

Til bekæmpelse af rapsjordlopper er godkendt Karate (0,2 kg pr. hektar), Kaiso Sorbie (0,1 kg pr. hektar modsvarer indholdet i 0,2 kg Karate), Nexide CS (0,06 liter pr. ha), Cythrin 500 (0,04 l pr. ha) og Cyperb 100/100 W (0,2 liter pr. ha). Med de nye afgifter er Karate og Kaiso Sorbie billigst. Der er kun få erfaringer med nedsatte doser.

Se [data og uddybende kommentarer](#).





Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008-2015. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som du nuværende runde fangbakker).