



## 9. REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER UGE 43

STØTTET AF

# Promilleafgiftsfonden for landbrug

Bekæmpelsestærsklen for larveangreb er pt. overskredet på ca. 35 procent af lokaliteterne.

Der er udstationeret gule fangbakker på ca. 75 lokaliteter for at følge forekomsten af rapsjordlopper og vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppens larver.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Der lægges flest æg i varmt vejr.

Forekomsten af rapsjordlopper er aftaget, og der er kun udløst bekæmpelse på én ny lokalitet i den forløbne uge. Bekæmpelsestærsklen har i år været overskredet på ca. 35 procent af lokaliteterne. Angrebsstyrken har været meget variabel fra lokalitet til lokalitet.

Bekæmpelse anbefales nu afsluttet. Senere bekæmpelse har også effekt, men effekten er mere svingende.


I nedenstående figur kan udviklingen i år sammenlignes med tidligere år. Af de viste år var de kraftigste angreb i efteråret 2008, hvor der var kraftige angreb i mange marker.

Til bekæmpelse af rapsjordlopper er godkendt Karate (0,2 kg pr. hektar), Kaiso Sorbie (0,1 kg pr. hektar modsvarer indholdet i 0,2 kg Karate), Nexide CS (0,06 liter pr. ha), Cythrin 500 (0,04 l pr. ha) og Cyperb 100/100 W (0,2 liter pr. ha). Med de nye afgifter er Karate og Kaiso Sorbie billigst. Der er kun få erfaringer med nedsatte doser.

**Registreringen i den kommende uge er sidste registrering i år.**

Se [data og uddybende kommentarer](#).





**Figur 1.** Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008-2015. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som du nuværende runde fangbakker).