
VIPIGLETS – DE FØRSTE TAL



AARHUS
UNIVERSITET
SCIENCE AND TECHNOLOGY

LENA RANGSTRUP-CHRISTENSEN
PH.D.-STIPENDIAT

VIPIGLET - WORK SHOP
13. MARTS 2015

PROGRAM

- ▶ Baggrund
- ▶ Lommebogen – teori og tal
- ▶ Obduktioner – teori og tal
- ▶ Opsamling
- ▶ Diskussion og spørgsmål

BAGGRUND OG MATERIALE

- ▶ **Hvad?** Undersøge risikofaktorer for pattegrisedødelighed i den dansk økologisk svineproduktion
- ▶ **Hvorfor?** En estimeret dødelighed i fravænningsperioden på mellem 25 og 40 % er uholdbart både ud fra et økonomisk og dyrevelfærds-mæssigt synspunkt .
- ▶ **Hvordan?**
 1. Detaljerede dødelighedsregistreringer foretaget i 9 besætninger over en etårig periode
 - › Ca. 6000 faringer
 2. Obduktioner af et udvalg af døde pattegrise fra de besætninger
 - › 100-125 pattegrise pr besætning pr årstid ~ 4000 obduktioner

DØDELIGHEDSREGISTRERINGER – AKA LOMMEBOGEN

- ▶ Registreringer fra juni til august 2014 (juli til september)
- ▶ Dødelighedsprocenterne er beregnet ud fra levendefødte
- ▶ Tallene er korrigerede efter bedste evne
 - Manglende registreringer
 - Mangelfulde registreringer
 - Ammesøer – Mellemsøer – Omsorgssøer
 - Forlænget fravænning
- ▶ Høje dødeligheder generelt!
- ▶ **Kvaliteten af mine beregninger er afhængig af kvaliteten af jeres registreringer 😊**

AMMESØER – BYTTESØER – MELLEMSØER


- ▶ Ammesøer- Byttesøer – Mellemsøer – Omsorgssøer
 - › Stor risiko for dobbeltregistreringer!
- ▶ Hvornår tælles grisen?

	1. tilsyn	Kastration	Forg/Vac	Fravænning
Bytteso/Mellemso – Egne grise	+	+	-	-
Bytteso/Mellemso – Nye grise	-	+	+	+
Ammeso	-	-	+	+
Omsorgsso	-	-/+	-/+	+

- ▶ Gøres det anderledes? **Gi mig besked** 😊

DØDELIGHED BESÆTNING 1

Juni - August 2014




Gns. frav. pr. faring: 11,4

Gns. levf. pr. faring: 14,6

Aflivede af levf.: 2,1 %

DØDELIGHED BESÆTNING 2

Juni - August 2014




Gns. frav. pr. faring: 11,4

Gns. levf. pr. faring: 15,7

Aflivede af levf.: 0,6 %

DØDELIGHED BESÆTNING 4

Juni -August 2014



Gns. frav. pr. faring: 11,4


Gns. levf. pr. faring: 15,5

Aflivede af levf.: 0,6 %



DØDELIGHED BESÆTNING 6

Juni - August 2014



Gns. frav. pr. faring: 9,7


Gns. levf. pr. faring: 13,6

Aflivede af levf.: 0 %



DØDELIGHED BESÆTNING 7

Juni - August 2014



Gns. frav. pr. faring: 10,8


Gns. levf. pr. faring: 14,8

Aflivede af levf.: 1,6 %



DØDELIGHED BESÆTNING 8

Juni - August 2014



Gns. frav. pr. faring: 9,4


Gns. levf. pr. faring: 13,8

Aflivede af levf.: 0 %



DØDELIGHED BESÆTNING 10

Juli - September 2014




Gns. frav. pr. faring: 8,4

Gns. levf. pr. faring: 13,5

Aflivede af levf.: 0,2 %



DØDELIGHED – ALLE BESÆTNINGER



DØDELIGHED - OPSAMLING


▶ Indtil 1. tilsyn	3% – 9%
▶ Indtil kastrering	11% - 24%
▶ Indtil Forg/vac	14% - 33%
▶ Indtil fravænning	22% - 38%
▶ Aflivede	0% - 2,1%

OBDUKTIONER – DØD OG RÅDDENSKAB


- ▶ Opgørelser fra 1. obduktionsrunde – sommer 2014
 - ▶ Indsamlet fra 28 søer fra samme farehold – efter fjernelsen af forgården er samlet fra hele holdet
 - ▶ Andelen af gylte/søer forsøgt afspejlet i stikprøven
 - ▶ Der er brugt ca. 3 minutter pr. gris
-
- ▶ Her er tale om en meget simpel fremstilling af data – der findes mange andre ting som der kan regnes på og tænkes over!
-
- ▶ **Husk at ALLE døde grise skal samles ind og fryses – grønne, balloner og halve 😊**

OBDUKTION – BESÆTNING 1


Diagnoser




Maveindhold klemte grise




Dødfødte




OBDUKTION – BESÆTNING 2



Maveindhold klemte grise




Dødfødte




OBDUKTION – BESÆTNING 3


Diagnoser



Maveindhold klemte grise




Dødfødte




OBDUKTION – BESÆTNING 4


Diagnoser



Maveindhold klemte grise




Dødfødte




OBDUKTION – BESÆTNING 6


Diagnoser




Maveindhold klemte grise




Dødfødte




OBDUKTION – BESÆTNING 7



Maveindhold klemte grise




Dødfødte




OBDUKTION – BESÆTNING 8


Diagnoser




Maveindhold klemte grise




Dødfødte




OBDUKTION – BESÆTNING 9



Maveindhold klemte grise




Dødfødte




OBDUKTION – BESÆTNING 10


Diagnoser



Maveindhold klemte grise



Dødfødte



OBDUKTIONER - OPSAMLING

- ▶ Klemt 25% - 52%
- ▶ Dødfødt 13% - 33%
- ▶ Sult 2% - 10%
- ▶ Svagt født 2% - 8%
- ▶ **Aflivede 2% - 17%**

OPSAMLING

- ▶ Lommebøgerne - høj dødelighed
 - › Fejl i registreringer?
 - › Fejl i udregningerne?
 - › Ekstrem varm sommer!
- ▶ Diagnoserne
 - › Mange flere obducerede grise er aflivet end hvad lommebøgerne angiver (!!!)
 - › Klemte grise udgør den største diagnose gruppe
 - › Størstedelen af de klemte grise havde mælk i maven
 - › Størstedelen af de dødfødte grise dør under faringen

MULIGHEDER!

- ▶ Relationer mellem søernes læg nr., huld og halthed og dødeligheden.
- ▶ Størrelsen af de obducerede grise. Er der diagnoser som er mere sandsynlige at se hos små grise modsat store grise?
- ▶ Har man større eller mindre chance for at overleve hvis man er født ind i et stort eller lille kuld?
- ▶ Er der større dødlighed hos grise som havde mange dødfødte kuldsøskende?
- ▶ Hvornår i fravænningsperioden dør der flest grise ved klemning?
- ▶ Har klemte grise andre diagnoser?
- ▶ Er det altid de små grise der bliver klemte?
- ▶ **Der er så mange muligheder! Kun fantasien og mine evner sætter grænserne 😊**

SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER





AARHUS
UNIVERSITET