

Så vårsædsafgrøderne i den rigtige rækkefølge

Der er meget at hente ved at etablere de økologiske vårsædsafgrøder i den rigtige rækkefølge. Og med korrekt sådybde og udsædsmængde kan der opnås merudbytter på et halvt ton pr. hektar.

Af Darran Thomsen,
Økologi, Seges
dat@seges.dk
tlf. 87 40 66 68

Det er vigtigt at planlægge såningen af forskellige afgrøder i foråret, så de afgrøder, der er mest følsomme for at få udskudt såningen, sås først.

Havre er den kornart, der

99 Havre er den kornart, der har det største udbyttetab, hvis såningen udsættes.

Darren Thomsen, Økologi, Seges

har det største udbyttetab, hvis såningen udsættes. Omfattende landsforsøg med såtid i økologisk dyrket havre viser således en udbyttened-



gang på 0,8 hkg pr. hektar for hver dag, såning udsættes. For byg er der ikke gennemført økologiske såtidforsøg. Men konventionelle forsøg viser et tab på 0,26 hkg pr. hektar, pr. dag såningen udsættes.

Hvede og triticale ligger formentlig midt imellem. Vårtriticale skal prioriteres højt, fordi den har den længste

vækstsæson og tidlig såning kan modvirke for sen høst.

Sådybdens betydning

Ensartet etablerede afgrøder kræver omhu ved indstilling af sådybde. Jorden kan yde forskellig modstand inden for marken og mellem markerne, og det er vigtigt at stille høje krav til indkøbt sårarbejde, for

perfekt såning er grundlaget for et godt udbytte.

Sådybden afhænger af art, og hvordan man har besluttet sig for at bekæmpe ukrudt i marken. Øverlig såning af korn giver hurtig dækning af jorden men begrænser muligheden for blindharvning og ukrudtsharvning. Bliver der sået for dybt, går det ud over plantebestanden.

Havre skal sås først, da det er den afgrøde, hvor der er størst udbyttetab ved sen såning. Agrofoto.

dre, hvis planterne angribes. Endelig giver tidlig såning en tidligere og mere sikker høst.

Hestebønner har store frø, som skal have en god vandforsyning for at komme i gang. Sådybden skal være otte cm og gerne dybere. Det kræver et højt skærtryk og langsom kørsel. Ofte ser vi, at det ikke lykkedes at så dybt nok.

Det rigtige plantetal

Forsøg fra 2013-14 viser, at udbyttet i vårbyg kan øges med to hkg pr. hektar ved at øge udsædsmængden fra 350 til 400 kerner. Det samme merudbytte viser forsøg i vårhvede, hvor man øger udsædsmængden fra 450 til 520 kerner pr. kvm.

Kommer plantetallet i bælg-sæd under den nedre grænse for anbefalingen, det vil sige 40 planter pr. kvm i hestebønner og 80 planter pr. kvm i lupiner, koster fejlen udbytte.

I hestebønne sigtes derfor efter 50 planter pr. kvm, når udsædsmængden beregnes. Vær opmærksom på, at tusindkornvægten varierer en del mellem sorter og partier.

Bælgsæd kan ikke kompensere for meget lave plantetal, i tillæg giver lavt plantetal i bælg-sæd frøukrudt og rødkrudt alt for gode betingelser.

Tidlig såning af hestebønne

Økologisk hestebønne skal sås tidligst muligt, selv hvis der skulle være udsigt til nattefrost.

Tidlig såning betyder, at planterne er længere fremme i udvikling, når der er størst risiko for tørke og bladlusangreb. Det betyder, at planterne er mindre følsomme, og at udbyttetabet vil være min-

Såning af økologiske vårsædsafgrøder

Art	Sådybde	Plantetal
Hestebønne	8-12 cm	40-60
Lupin med vårhvede	3-5 cm	80-100 + 100
Havre	4 cm	400
Vårtriticale	4 cm	400
Vårbyg	4 cm	400
Vårhvede	4 cm	520

Forgrenede lupinsorter: 80. Uforgrenede lupinsorter: 100.

Rækkefølge såning

Økologiske afgrøder bør sås i nævnte rækkefølge i foråret:

- Havre, hestebønne, triticale, hvede, vårbyg.

SUMAS

Suldrup Maskinforretning A/S

Aut. VVS

Hjortholmvej 14 - 9541 Suldrup - Tlf. 98 37 83 44 - Fax 96 86 40 04

www.sumas.dk - salg@sumas.dk

Glæd dig...

SUMAS

75