

## FOR MANGE KØER AFLIVES FORKERT

STØTTET AF

# Promilleafgiftsfonden for landbrug

Korrekt aflivning omfatter afblødning af dyret efter bedøvelse med boltipistol. Det undlader alt for mange kvægbrugere.

Mere end 5 pct. af de køer, der skydes med boltipistol, afblødes ikke. Det viser SEGES Kvægs seneste opgørelse fra oktober måned. Det er en kraftig stigning sammenlignet med de tre foregående opgørelser, der lå på 0 pct. (april 2015), 1 pct. (oktober 2015) og 2,5 pct. (april 2016).

”Det er meget skuffende, at så mange kvægbrugere vil løbe den reelle risiko, der er, for at en ko vågner op igen efter at være blevet skudt med boltipistol,” siger dyrlæge Peter Raundal, SEGES Kvæg og fortsætter:

”Og uanset om man tror, at dyret dør ved skydning med boltipistol, kræver lovgivningen, at dyret afblødes straks efter – der er ingen vej udenom.”

For at sikre dyrevelfærden, også i forbindelse med aflivning, undersøger SEGES Kvæg jævnligt stikprøver af alle køer og kalve, der bliver indleveret til DAKA. Efter hver undersøgelse er resultatet blevet offentliggjort, og der er blevet gjort opmærksom på, hvorledes korrekt aflivning skal foretages. Samtidig har alle kvægbrugere, der har indleveret ikke-korrekt aflivede dyr, fået et brev, der understreger nødvendigheden af at afbløde.

”Jeg har derfor svært ved at tro, at den manglende afblødning kan skyldes uvidenhed, og hvis man er i tvivl om aflivningsproceduren, skal man tage fat i sin dyrlæge og få den nødvendige



Tegningen viser korrekt aflivning med positionering af boltipistol og efterfølgende afblødning.

instruktion,” siger Peter Raundal.

For kalve ser det ikke meget bedre ud. Ved de fire undersøgelser fra april 2015 til oktober 2016 har andelen af ikke-korrekt aflivede ligget mellem 4,5 pct. og 7,5 pct.

Alle kalve, der skydes med bolt pistol, skal også afblødes.

Selvdøde dyr indgår ikke i statistikken.