



ANGREB AF GRÆSFLUELARVER I VINTERSÆD

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Angreb er i år mere udbredt end normalt. Der er ingen muligheder for bekæmpelse.

I dette forår er der modtaget flere henvendelser om angreb af græsfluelarver (*Opomyza florum*) i vintersæd end normalt. Hjerteskuddet på især sideskuddene angribes og gulfarves og visner, fordi græsfluelarven gnaver inde i strået ved basis. Larverne er hvide og lemmeløse med sort mundbrod. Se billeder nedenfor. Angreb ligner angreb af fritfluelarver, der dog ikke optræder på nuværende årstid. I nogle marker er der også set dannelse af mange nye sideskud, hvilket vurderes at skyldes en måde at kompensere for angreb på.

Græsfluer er trods navnet ikke knyttet til græsdyrkning. De kommer tilflyvende til vintersæden om efteråret for at ligge æg, og ofte ses mest angreb i tidligt såede marker. Æggene overvintrer og klækker fra omkring 1. marts. Forpupning sker omkring primo maj. På nuværende tidspunkt har nogle af larverne forpuppet sig i planterne eller i jorden og angrebene vil nu aftage. Pupperne er små brune tøndepupper af samme størrelse som larverne, dvs. ca. 5 mm lange.

Angreb af græsfluelarver ses hvert år i de fleste vintersædsmarker, men oftest er angrebene svage og uden betydning, da kun få sideskud er angrebne, og planterne kompenserer for angrebene. I år er angrebene dog kraftigere end normalt og mulighederne for at kompensere måske også mindre grundet svagere vækst end normalt.

Der er ikke nogen muligheder for bekæmpelse.





Billede 1. Gule hjerteskid i hvede grundet angreb af græsfluelarver. Nogle af de angrebne skud er markeret med en pil.

Foto fra medio april 2016: Carsten Kløcher, Djursland Landboforening.



Billede 2. Græsfluelarver fra 2 hvedeskud fotograferet 28.april. Larverne ligner alle andre fluelarver, men kan artsbestemmes ved at se på bagenden i stereolup. Alle fluelarver er lemme-løse og har en sort mundbrod.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.