



BRUG IKKE BISCAYA UNDER BLOMSTRING I RAPS I 2016

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Bayer anbefaler, at Biscaya ikke anvendes i raps under blomstring i 2016 pga en lille risiko for overskridelse af grænseværdien i honning. Grænseværdien forventes dog hævet igen.

Firmaet Bayer har skrevet nedenstående, og har bedt SEGES viderebringe dette.

Som det fremgår, er der ifølge firmaet en lille risiko for overskridelse af grænseværdien for thiacloprid i honning ved sprøjtning med Biscaya (thiacloprid) under blomstring. Firmaet fraråder derfor sprøjtning med Biscaya i raps under blomstring i 2016. Sprøjtning i knopstadiet (frem til vækststadiet 59) frarådes derimod ikke i 2016. Firmaet forventer, at grænseværdien bliver hævet igen før næste vækstsæson.

Bayer skriver:

"EU har pr. 15-02-2016 nedsat grænseværdien for thiacloprid (aktivstoffet i Biscaya) i honning fra 0,2 mg/kg til 0,05 mg/kg, tilsyneladende uden begrundelse. Umiddelbart derefter blev der indledt en proces til at genetablere den oprindelige grænseværdi på 0,2 mg/kg., hvilket EFSA (Europæiske Fødevareagentur) vurderede som uproblematisk. Forslaget blev sat til afstemning i EU 22.-23. marts 2016.

Terrorangrebet i Bruxelles var en forfærdelig begivenhed, der skabte store problemer. Desværre skabte det også små problemer, nemlig at afstemningen om grænseværdien for thiacloprid blev aflyst. På nuværende tidspunkt er der derfor usikkerhed om, hvornår vi kan vende tilbage til den oprindelige grænseværdi. Bayer forventer, at det sker hurtigst muligt. For nuværende gælder dog den lavere grænseværdi på 0,05 mg/kg.

Anvendelse af Biscaya i blomstrende raps kan udgøre en lille risiko for at overskride den lavere grænseværdi i honning. Bayer anbefaler derfor, at Biscaya ikke bliver anvendt i blomstrende

raps i 2016.

Bayer anbefaler:

I 2016 kan Biscaya fortsat anvendes sikkert i raps før blomstring. Altså frem til vækststadiet 59. Langt den største anvendelse af Biscaya i raps er mod glimmerbøsser og foregår typisk før blomstring. Her er der således ingen ændring.

I 2016 bør Biscaya ikke anvendes i raps under blomstring (vækststadiet 60-69) mod skulpesnudebiller.

I vækstsæsonen 2017 forventer Bayer, at Biscaya igen kan anbefales i raps under blomstring.

Der er ingen ændringer i selve godkendelsen af Biscaya, og Bayer har valgt frivilligt at informere de relevante parter om denne midlertidige, mulige risiko for overskridelse af grænseværdien i honning.

Bayer opfordrer brugere af Biscaya til at følge vejledningen for at udvise godt landmandskab og skabe et positivt syn på landbruget.

I Fødevarestyrelsens kontroloversigt har der over flere år ikke været fund med pesticider, herunder thiacloprid, i honning.

Biscaya er godkendt til mindre anvendelse i hvidkløver til frø og off-label godkendt i korsblomstrede frøafgrøder. Begge områder dækker blot behandling inden blomstring. Der er derfor ingen ændringer i anvendelsen af Biscaya til disse afgrøder.

Danmarks Biavlerforening anbefaler generelt ved sprøjtning, at landmanden/sprøjteførereren gør følgende:

Hold kontakt til områdets biavler, så du ved hvor bigårde er placeret, og orienter biavleren om planer for sprøjtning.

Se efter om der er bier i marken, inden du begynder at sprøjte en mark - også selv om det ikke er en blomstrende mark, da bier også tiltrækkes af marker med bladlus.

Sprøjt kun over åben blomst i tidsrummet mellem kl. 21 og 03 (sommertid), men undersøg marken inden sprøjtningen påbegyndes, da bierne i varmt vejr godt kan flyve ud efter kl. 21!

Brug i videst mulig omfang skånsomste midler, der ikke er mærket "Farlig for bier" og følg vejledningen.

Husk at bierne bidrager til bestøvning af dine afgrøder, og er med til at øge dit udbytte.

Spørgsmål bedes rettet til:

Klaus Heltbech, Crop Manager, Bayer A/S, tlf.: 21 44 15 41 eller

Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager, Bayer A/S, tlf.: 24 29 99 76", slutter Bayer.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

