



MINDRE ANVENDELSE TIL FOLICUR XPERT MOD SNESKIMMEL I VINTERSÆD OG FRØGRÆS

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Vær opmærksom på, at efterårsanvendelse tæller hårdt i triazolreglerne. Randbehandling er i mange tilfælde tilstrækkelig, og herved kan triazolreglerne lettere overholdes ved svampesprøjtning i foråret.

Miljøstyrelsen meddeler, at der netop er givet en mindre anvendelse til brug af **Folicur Xpert** om efteråret mod sneskimmel i vintersæd samt mod rust og sneskimmel i frøgræs. Der må maksimalt anvendes 0,78 liter Folicur Xpert i efteråret og maksimalt 1 behandling i efteråret. Hvis der behandles både efterår og forår, må den samlede mængde ikke overstige 1,0 liter Folicur Xpert.

Behandlet frøgræs må ikke anvendes til afgræsning. Halm fra frøgræs må tidligst anvendes til foder året efter behandling.

Afstandskravet til vandmiljøet er 10 meter.

Folicur Xpert indeholder aktivstoffet tebuconazol (160 g/l) og er derfor omfattet af restriktionerne på anvendelsen af triazoler. Når tebuconazol udbringes om efteråret medfører det, at der hele sæsonen maksimalt må anvendes 175 gram tebuconazol pr. ha. Anvendes der den maksimalt tilladte dosering på 0,78 liter Folicur Xpert pr. ha svarende til 125 gram tebuconazol pr. ha om efteråret, tæller det 71,3 procent af den maksimalt tilladte triazolmængde. Se yderligere om triazolreglerne i [Artikel nr. 1183](#).

Hvis der anvendes 0,6 liter Folicur Xpert mod sneskimmel i hele marken, bruges der 55 procent af triazolkvoten. Dette skal man især være opmærksom på i vintersædsarter, hvor der udføres flest svampesprøjtninger, dvs. ofte i vinterhvede og tritcale. I hvede kan der ved forebyggelse af sneskimmel i efteråret med 0,6 liter Folicur Xpert f.eks. anvendes følgende forår og sommer:

0,25 l Prosaro (18 procent) efterfulgt af 0,6 l Viverda (24 procent) hhv. ren Proline (0 procent). Der er i eksemplet samlet brugt 97 procent af triazolkvoten.

Randbehandling er i mange tilfælde tilstrækkelig, og herved kan triazolreglerne lettere overholdes ved svampesprøjtning i foråret.

Se yderligere om den mindre anvendelse i [Middeldatabasen](#).

Se også mere om mindre anvendelse til Folicur EW 250 i frøgræs i [Artikel nr. 3057](#).